



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2014

llh

GMP - WHO

100% Thảo Dược

NPLUVICO

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm



- Suy tuần hoàn não
- Đi chứng tai biến mạch máu não
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên
- Rối loạn thần kinh cảm giác

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19, Đường 18, Khu phố 3, P.Linh Châu, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Thành phần:
Cao khô lá Bạch quả (Ginkgo biloba Folium Extract) 100 mg
Cao khô rễ Đinh Lăng (Cassia siamea Radix Polakorea Extract) 300 mg
Tá dược và tá dược tinh khiết vừa đủ 1 viên nang mềm.

Chỉ định:
- Suy tuần hoàn não và các biểu hiện chức năng: chóng mặt, nhức đầu giảm trí nhớ, giảm nhận thức, rối loạn vận động, rối loạn cảm xúc.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: bệnh động mạch chi dưới, hội chứng Raynaud, tê lạnh và tím tái đầu chi.
- Rối loạn thần kinh cảm giác, rối loạn thị giác (bệnh võng mạc), bệnh về tai mũi họng (chóng mặt, ò tai, giảm thính lực).
- Di chứng tai biến mạch máu não và chấn thương sọ não.
- Phòng ngừa và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.

Chống chỉ định, Tác dụng không mong muốn: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Liều lượng và cách dùng:
Cách dùng: Thuốc được dùng bằng đường uống, uống sau bữa ăn.
Liều lượng:
- Người lớn: Uống 1 - 2 viên nang x 2 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên nang/ngày.
- Cải thiện tuần hoàn não và toàn thân: mỗi đợt dùng từ 1 - 4 tuần.
- Hỗ trợ điều trị di chứng do tai biến mạch máu não: có thể dùng lâu dài.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCS


ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

GMP - WHO

100% Herbal Medicin

NPLUVICO

Box of 6 blisters x 10 soft capsules



- Cerebral circulatory failure
- Cerebral vascular accident
- Peripheral circulatory disorders
- Neurosensory disorders

Sản xuất bởi:
NATURE VIET NAM PHARMA JSC
No.19 Street No.18, Linh Châu ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City.

Compositions:
Ginkgo Extract of Foliu Ginkgo biloba 100 mg
Ginkgo Extract of Radix Polakorea thutocosa 300 mg
Excipients q.s for 1 soft capsule.

Indications:
- Cerebral circulatory failure: dizziness, headaches, memory loss, decreased awareness, movement disorders, emotional disturbance.
- Peripheral circulatory disorders: enteral disease of lower limb, Raynaud's syndrome, numb, dystrophic extremities.
- Neurosensory disorders.
- Cerebral vascular accident.
- Prevent and slow the progression of Alzheimer's disease in the elderly.

Contraindications, Side effects:
See the package insert

Dose and Usage:
Usage: oral route, take after meals.
Dose:
- Adult: take 1 - 2 soft capsules once, two times a day.
- Children over 12 years old: take 1 soft capsule a day.
- Improve cerebral circulation: each periodic time use from 1 to 4 weeks.
- Supportive treatment due to cerebral vascular accident: may be use long-term.

Storage: Store in a dry and cool place, below 30°C, protect from the light.

Specification: In - house

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

NPLUVICO
Cao khô lá Bạch quả (Ginkgo biloba Folium Extract) 100 mg
Cao khô rễ Đinh Lăng (Cassia siamea Radix Polakorea Extract) 300 mg
Sản xuất bởi: NATURE VIET NAM PHARMA JSC

NPLUVICO
Cao khô lá Bạch quả (Ginkgo biloba Folium Extract) 100 mg
Cao khô rễ Đinh Lăng (Cassia siamea Radix Polakorea Extract) 300 mg
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

NPLUVICO
Cao khô lá Bạch quả (Ginkgo biloba Folium Extract) 100 mg
Cao khô rễ Đinh Lăng (Cassia siamea Radix Polakorea Extract) 300 mg
Sản xuất bởi: NATURE VIET NAM PHARMA JSC

NPLUVICO
Cao khô lá Bạch quả (Ginkgo biloba Folium Extract) 100 mg
Cao khô rễ Đinh Lăng (Cassia siamea Radix Polakorea Extract) 300 mg
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

NPLUVICO
Cao khô lá Bạch quả (Ginkgo biloba Folium Extract) 100 mg
Cao khô rễ Đinh Lăng (Cassia siamea Radix Polakorea Extract) 300 mg
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Số 18 SX: Hạn dùng: 300 mg

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NPLUVICO (Cao lá Ginkgo biloba, Cao khô rễ Đinh lăng)

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: Cao khô lá Bạch quả (*Ciccus Extractum Folium Ginkgo biloba*)..... 100 mg

Cao khô rễ Đinh lăng (*Ciccus Extractum Radix Poliscias fruticosa*).....300 mg

Tá dược: Dầu đậu nành, Lecithin, Palm oil, Beeswax, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Nipagin, Nipasol, Ethyl vanilin, Brilliant blue, Tartrazin, Allura red, Oxyd sắt đỏ, Titan dioxyd, Ethanol 96%, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên nang mềm.

ĐƯỢC LỰC HỌC

NPLUVICO chứa cao chiết từ lá bạch quả (*Folium Ginkgo biloba*) được cô đặc sấy khô và tiêu chuẩn hóa với thành phần chính là Ginkgo heterosides, Ginkgolide – bilobalide và cao rễ Đinh lăng (*Radix Poliscias fruticosa*) thể hiện các đặc tính dược lý đáng chú ý như sau:

Cao khô lá Ginkgo biloba:

- Trên tuần hoàn động mạch: Làm gia tăng tuần hoàn ngoại vi hoặc tuần hoàn não được xác định qua phương pháp chụp lưu biến, chụp tuần hoàn phóng xạ hoặc qua hiện tượng xung huyết cảm ứng.
- Trên tuần hoàn mao mạch: Giúp tính thấm của mao mạch trở về bình thường và tăng sức đề kháng mao mạch trong chứng phù tự phát có chu kỳ.
- Hoạt hóa chuyển hóa năng lượng tế bào: Bằng cách gia tăng tiêu thụ glucose ở não bộ và gần như làm cho sự tiêu thụ oxy trở về bình thường.
- Giảm nguy cơ huyết khối vi tuần hoàn: Giảm rõ rệt hiện tượng kết tập tiểu cầu ở người khi được sử dụng Ginkgo biloba.
- Chống oxy hóa do đối kháng với sự hình thành các gốc tự do và sự peroxyd hóa lipide của màng tế bào.

Cao khô rễ Đinh lăng:

- Theo " Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam ", Đinh lăng được coi là nhân sâm của Việt Nam. Trong Cao rễ đinh lăng có một số thành phần giống như thành phần trong nhân sâm : các alcaloit, glucosit, saponin, flavonoid, tanin, vitamin B1, các axit amin: lyzin, xystei, methionin là những axit amin không thể thay thế.

- Cao khô rễ Đinh lăng có tác dụng tăng sức dẻo dai, tăng sức đề kháng của cơ thể, chữa mệt mỏi, biếng hoạt động, giúp cơ thể chóng hồi phục sau khi ốm, ốm nặng.

Sự kết hợp giữa cao khô rễ Đinh lăng và cao lá Bạch quả là một sự kết hợp tốt về dược lực. Đinh lăng có tác dụng tăng cường khả năng hoạt huyết của cao Bạch quả, đồng thời có tác dụng bồi bổ cơ thể, điều trị suy nhược thần kinh và cơ thể.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

- Các ginkgolide A, B và bilobalide có sinh khả dụng đường uống khoảng 80 - 90% , nồng độ tối đa đạt được sau khoảng 1- 2 giờ.
- Thời gian bán thải kéo dài khoảng 4 giờ (bilobalide, ginkgolide A) đến 10 giờ (ginkgolide B).
- Các hợp chất này không bị phân giải trong cơ thể và được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, một lượng nhỏ được thải trừ qua phân.

CHỈ ĐỊNH

- Suy tuần hoàn não và các biểu hiện chức năng: chóng mặt, nhức đầu giảm trí nhớ, giảm nhận thức, rối loạn vận động, rối loạn cảm xúc...
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: bệnh động mạch chi dưới, hội chứng Raynaud, tê lạnh và tím tái đầu chi.
- Rối loạn thần kinh cảm giác, rối loạn thị giác (bệnh võng mạc), bệnh về tai mũi họng (chóng mặt, ù tai, giảm thính lực).
- Di chứng tai biến mạch máu não và chấn thương sọ não.
- Phòng ngừa và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Cách dùng: Thuốc được dùng bằng đường uống, uống sau bữa ăn.

Liều lượng:

- Người lớn: Uống 1 - 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên/lần/ngày.
- Cải thiện tuần hoàn não và toàn thân: mỗi đợt dùng từ 1 - 4 tuần.
- Hỗ trợ điều trị di chứng do tai biến mạch máu não: có thể dùng lâu dài.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.
- Người có rối loạn chảy máu, đang xuất huyết
- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

- NPLUVICO không phải là thuốc chống tăng huyết áp nên không thể dùng để thay thế cho các thuốc chống tăng huyết áp chuyên biệt.
- Với bệnh nhân bị rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông máu.
- Sau khi dùng thuốc 1 tháng, nếu các triệu chứng không được cải thiện nên ngừng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo.

PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ MANG THAI HOẶC CHO CON BÚ

Do chưa có dữ liệu lâm sàng phù hợp, khuyến cáo không sử dụng NPLUVICO cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng phụ đã được báo cáo hiếm gặp: rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, choáng váng, phản ứng da mẫn cảm, dị ứng da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo



QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Trường hợp lạm dụng thuốc quá độ (20 viên một lần/ 50kg) cần theo dõi huyết áp và nhịp tim tại bệnh viện

BẢO QUẢN: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

**ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19 Đường 18, KP. 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
ĐT: 08- 37201027 , Fax: 08 - 62838557



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

