


Cao Dán Giảm Đau
Salonpas®

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Thuốc dùng ngoài.

Thành phần dược chất: Methyl salicylate.....6,29 %; <i>d,l</i> -Camphor.....1,24 % <i>l</i> -Menthol.....5,71 %; Tocopherol acetate.....2,00 %
Thành phần tá dược: Raw rubber, Polyisobutylene, Hydrogenated rosin glycerol ester, Maleated rosin glycerol ester, Polybutene, Zinc oxide, Hydrated silicon dioxide, Titanium oxide, Starch grafted acrylate 1000, Dibutylhydroxytoluen, Perfume.
Dạng bào chế: Cao dán.
Quy cách đóng gói: Bao 2 miếng (6,5 cm × 4,2 cm). Bao 10 miếng (6,5 cm × 4,2 cm). Hộp 1 bao 10 miếng (6,5 cm × 4,2 cm). Hộp 1 bao 20 miếng (6,5 cm × 4,2 cm). Hộp 2 bao 10 miếng (6,5 cm × 4,2 cm). Hộp 4 bao 10 miếng (6,5 cm × 4,2 cm).
Chỉ định: Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Dùng giảm đau, kháng viêm trong các cơn đau liên quan đến ■ đau vai ■ đau lưng ■ đau cơ ■ mỏi cơ ■ bầm tím ■ bong gân ■ căng cơ ■ đau đầu ■ đau răng. Trẻ em dưới 12 tuổi phải hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng.
Chống chỉ định: Không sử dụng: ■ trên vùng da tổn thương, vết thương hở. ■ trên mắt, vùng da quanh mắt, niêm mạc. ■ dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
Liều lượng, cách dùng: ■ Rửa sạch, lau khô vùng da bị đau. ■ Gỡ miếng cao dán ra khỏi tấm phim. ■ Dán vào chỗ bị đau không quá 3 lần trong ngày và không quá 7 ngày. ■ Gỡ miếng cao dán ra khỏi da sau 8 giờ dán.
Lưu ý: Chỉ dùng ngoài da. Không dùng vào mục đích khác ngoài chỉ định. Không dùng chung với băng dán nóng. Không băng chặt. Hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng nếu: ■ dị ứng với thuốc dùng ngoài da. ■ đang dùng thuốc khác. ■ phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

<p>Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến Bác sĩ nếu:</p> <ul style="list-style-type: none">■ tình trạng xấu đi. ■ triệu chứng kéo dài hơn 7 ngày hay hết rồi tái phát vài ngày sau đó. ■ các phản ứng da như đỏ da, ngứa, phát ban, kích ứng quá mức, cảm giác bỏng rát, sưng hoặc phỏng rộp có thể xảy ra. <p>Đề xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải hãy đến Bác sĩ hay trạm y tế gần nhất.</p> <p>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</p> <p>Sử dụng cho Phụ nữ có thai: Tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết trong 6 tháng đầu thai kỳ. Không sử dụng trong 3 tháng cuối thai kỳ.</p> <p>Sử dụng cho Phụ nữ đang cho con bú: Tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu chưa tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.</p> <p>Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.</p>
<p>Tương tác:</p> <p>Với một lượng rất nhỏ hoạt chất được hấp thu vào cơ thể sẽ không làm tăng khả năng tương tác với các thuốc khác.</p> <p>Với bệnh nhân đang dùng các thuốc chống đông đường uống (warfarin), việc sử dụng quá mức sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu.</p> <p>Có tương tác hỗ trợ với các thuốc giảm đau khác.</p>
<p>Tác dụng không mong muốn:</p> <p>Các phản ứng da như đỏ da, ngứa, phát ban, sưng hoặc phỏng rộp có thể xảy ra. Nếu các triệu chứng xảy ra quá mức, ngừng sử dụng Salonpas®. Thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ.</p>
<p>Quá liều và cách xử trí:</p> <p>Các triệu chứng bất thường như buồn nôn hoặc nôn có thể xảy ra. Trong trường hợp sử dụng một lượng lớn thuốc, và xảy ra triệu chứng bất thường, ngưng sử dụng, rửa sạch vùng da dán thuốc bằng nước sạch và tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.</p>
<p>Hạn dùng:</p> <p>36 tháng kể từ ngày sản xuất đối với bao 2 miếng, 10 miếng và 20 miếng. Không sử dụng thuốc quá hạn dùng in trên bao bì. Lưu ý, ngay cả khi thuốc vẫn còn trong hạn dùng, sử dụng càng sớm càng tốt sau khi mở bao.</p>
<p>Điều kiện bảo quản:</p> <p>Bảo quản dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp.</p> <p>Đề xa tầm tay trẻ em. Để tránh nhầm lẫn, không bỏ thuốc vào bao bì khác để bảo quản.</p>
<p>Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở.</p> <p>Sản xuất tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam Số 14-15, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam</p> <p>Được nhượng quyền bởi Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Hisamitsu 408 Tashirodaikan-machi, Tosu, Saga, Nhật Bản</p> <p>®-Nhãn hiệu đã được bảo hộ</p> <p> In-JX18104-32</p>