

Salonpas®

Pain Relief Patch
Cao Dán Giảm Đau

**ẤN VÀO
ĐỂ MỜ**

mùi bạc hà

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Lưu ý: Chỉ sử dụng ngoài da. ■ Chỉ sử dụng theo hướng dẫn. ■ Không dùng kèm với băng dán nóng. ■ Không băng chặt. ■ Hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn dị ứng với sản phẩm dùng ngoài da. **Ngừng sử dụng và hỏi ý kiến Bác sĩ nếu** ■ tình trạng xấu đi. ■ triệu chứng kéo dài trên 5 ngày. ■ triệu chứng hết rồi tái phát vài ngày sau đó.

Sử dụng cho Phụ nữ có thai: Tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết trong 6 tháng đầu thai kỳ. Không sử dụng trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Sử dụng cho Phụ nữ đang cho con bú: Tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu chưa tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ. **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng. ■ **Đề xa tầm tay trẻ em.** Nếu nuốt phải, hãy đến Bác sĩ hoặc trạm y tế gần nhất.

Thành phần hoạt chất: (cho 1 miếng dán): Methyl salicylate...105 mg; 2-Menthol...31,5 mg

Thành phần tá dược: Polyisobutylene, Liquid paraffin, Synthetic aluminum silicate, Alicyclic saturated hydrocarbon resin, Styrene isoprene styrene block copolymer.

Dạng bào chế: Cao dán.

Chỉ định: Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Dùng giảm đau, kháng viêm trong các cơn đau liên quan đến: ■ đau cổ ■ đau vai ■ đau khớp ■ viêm khớp ■ đau lưng ■ căng cơ ■ bầm tím ■ bong gân.

Trẻ em dưới 12 tuổi: Phải hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng.

Liều dùng, cách dùng: ■ Rửa sạch, lau khô vùng da bị đau. ■ Gỡ miếng cao dán ra khỏi tấm phim và dán vào chỗ bị đau. ■ Không sử dụng quá 4 miếng trong một ngày. ■ Chỉ dán một miếng một lần cho mỗi vùng da bị đau. ■ Không sử dụng quá 2 miếng một ngày cho mỗi vùng da bị đau. ■ Gỡ bỏ miếng dán sau 12 giờ dán. ■ Không sử dụng miếng dán quá 5 ngày liên tục trên một vùng da bị đau.

Chống chỉ định: Không sử dụng: ■ trên vùng da bị tổn thương hoặc vết thương hở. ■ trên mắt, vùng da quanh mắt, niêm mạc hoặc vùng da nổi mụn. ■ cho người có tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. ■ cùng thời điểm với các sản phẩm giảm đau dùng ngoài khác. ■ cho các đối tượng sau: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Tương tác: ■ Với một lượng rất nhỏ hoạt chất được hấp thu vào cơ thể sẽ không làm tăng khả năng tương tác với các thuốc khác. ■ Với bệnh nhân đang dùng các thuốc chống đông đường uống (warfarin), việc sử dụng quá mức sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu. ■ Có tương tác hỗ trợ với các thuốc giảm đau khác.

Tác dụng không mong muốn: ■ Các phản ứng da như đỏ da, ngứa, phát ban, kích ứng quá mức, cảm giác bỏng rát, sưng hoặc phỏng rộp có thể xảy ra. ■ Nếu các triệu chứng trên xảy ra quá mức, việc trị liệu bằng Salonpas® Pain Relief Patch phải dừng lại và thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Quá liều và cách xử trí: Các triệu chứng bất thường như buồn nôn hoặc nôn có thể xảy ra. Trong trường hợp sử dụng một lượng lớn thuốc, nếu xảy ra triệu chứng bất thường, ngưng sử dụng, rửa sạch vùng da dán thuốc bằng nước sạch và tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 bao 5 miếng (7 cm x 10 cm).

Điều kiện bảo quản: ■ Bảo quản dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp. ■ Đề xa tầm tay trẻ em. ■ Để tránh sử dụng nhầm lẫn, không bỏ thuốc vào bao bì khác để bảo quản.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc quá hạn in trên bao bì. Lưu ý, ngay cả khi thuốc vẫn còn trong hạn dùng, sử dụng càng sớm càng tốt sau khi mở bao.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đề xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở.

® Nhãn hiệu đã được bảo hộ

SDK: VD-18885-13