



**CẮT MỜ BẰNG TAY Ở ĐÂY**

**ZIP** → ĐÓNG BAO LẠI SAU KHI MỜ

SALONSIP

2 MIẾNG

Gel-Patch.

14cm × 10cm

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



**1**  
Lấy miếng cao dán.



**2**  
Gỡ miếng phim một bên ra.



**3**  
Dán lên vùng da bị đau.



**4**  
Gỡ miếng phim còn lại.



**5**  
Kéo thẳng và miết kỹ miếng dán.

<p><b>Lưu ý:</b> Chỉ dùng ngoài da. <b>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</b> Để xa tầm tay trẻ em. Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</p> <p><b>Thành phần hoạt chất:</b> (cho 100 g cao thuốc/1000 cm<sup>2</sup>) Glycol salicylate...1,25 g, <i>l</i>-Menthol...1,00 g, <i>o</i>/<i>l</i>-Camphor...0,30 g, Tocopherol acetate...1,00 g</p> <p><b>Thành phần tá dược:</b> Gelatin, Titanium oxide, Synthetic aluminum silicate, Isopropylmethyl phenol, Polyglycerol polyglycidyl ether, Polyacrylic acid, Partially hydrolyzed polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol monostearate, Partially neutralized polyacrylate, Glycerin, Nước tinh khiết, Perfume.</p> <p><b>Dạng bào chế:</b> Cao dán.</p> <p><b>Chỉ định:</b> Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên: Dùng giảm đau, kháng viêm trong các cơn đau liên quan đến: ■ <b>mỏi cơ</b> ■ <b>đau cơ</b> ■ <b>đau vai</b> ■ <b>đau lưng đơn thuần</b> ■ <b>bầm tím</b> ■ <b>bong gân</b> ■ <b>căng cơ</b> ■ <b>viêm khớp</b></p> <p><b>Liều lượng, cách dùng:</b> Rửa sạch, lau khô vùng da bị đau. Gỡ miếng cao dán ra khỏi tấm phim và dán vào chỗ bị đau không quá 4 lần trong ngày. Gỡ miếng cao dán ra khỏi da sau 8 giờ dán.</p> <p><b>Chống chỉ định:</b> Không dán lên vùng da tổn thương hoặc vết thương hở. Không sử dụng cho người có tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. Không dùng thuốc cho các đối tượng sau: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc cơ giật do sốt cao.</p> <p><b>Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:</b> Chỉ dùng ngoài da. Chỉ sử dụng theo hướng dẫn. Tránh tiếp xúc với mắt, niêm mạc và vùng da nổi mụn. Không dùng kèm với băng dán nóng. Không băng chặt. Để xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải, hãy đến Bác sĩ hay trạm y tế gần nhất.</p> <p><b>Sử dụng cho Phụ nữ có thai:</b> Tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết trong 6 tháng đầu thai kỳ. Không sử dụng trong 3 tháng cuối thai kỳ.</p>	<p><b>Sử dụng cho Phụ nữ đang cho con bú:</b> Tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu chưa tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.</p> <p><b>Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:</b> Không ảnh hưởng.</p> <p><b>Tương tác:</b> Với lượng rất nhỏ hoạt chất được hấp thu vào cơ thể sẽ không làm tăng khả năng tương tác với các thuốc khác. Với bệnh nhân đang dùng các thuốc chống đông đường uống (warfarin), việc sử dụng quá mức sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu. Có tương tác với các thuốc giảm đau khác.</p> <p><b>Tác dụng không mong muốn:</b> Các phản ứng da như đỏ da, ngứa, phát ban, kích ứng quá mức, cảm giác bỏng rát, sưng hoặc phỏng rộp có thể xảy ra. Nếu các triệu chứng này xảy ra quá mức, ngưng việc trị liệu bằng SALONSIP® Gel-Patch® và thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ.</p> <p><b>Hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn</b> ■ dị ứng với sản phẩm thuốc dùng ngoài. ■ đang dùng thuốc khác.</p> <p><b>Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến Bác sĩ nếu</b> ■ tình trạng xấu đi. ■ triệu chứng kéo dài hơn 7 ngày hoặc hết rồi tái phát vài ngày sau đó.</p> <p><b>Quá liều và cách xử trí:</b> Các triệu chứng bất thường như buồn nôn hoặc nôn có thể xảy ra. Trong trường hợp sử dụng một lượng lớn thuốc và xảy ra triệu chứng bất thường, ngưng sử dụng, rửa sạch vùng da dán thuốc bằng nước sạch và tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.</p> <p><b>Quy cách đóng gói:</b> Bao 2 miếng (14 cm × 10 cm).</p> <p><b>Điều kiện bảo quản:</b> Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em. Để tránh sử dụng nhầm lẫn, không bỏ thuốc vào bao bì khác để bảo quản.</p> <p><b>Hạn dùng:</b> 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc quá hạn in trên bao bì. Lưu ý, ngay cả khi thuốc vẫn còn trong hạn dùng, sử dụng càng sớm càng tốt sau khi mở bao.</p>
---	---

Sản xuất tại **Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam**  
Số 14-15, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình  
Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Được chuyển giao công nghệ từ **Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Hisamitsu**  
408 Tashirodaikan-machi  
Tosu, Saga, Nhật Bản

SDK: VD-28645-17

©: Nhân hiệu đã được bảo hộ.  8 935106 261111

\*1 So với cùng miếng dán có góc vuông. Theo dữ liệu đã nghiên cứu.

**Tiêu chuẩn áp dụng:** Tiêu chuẩn cơ sở.

Số lô SX: 3410

Ngày SX: 11.10.2019

HD: 11.10.2022

HU-X718A05-32