



HIỆP HỘI
NATTOKINASE NHẬT BẢN

NattoEnzym

**Hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ
do cục máu đông**

Nguyên liệu Nhật Bản

日本製の原料を使用



THÀNH PHẦN:

Hàm lượng trong 1 viên

Nattokinase ... 670 FU

Phụ liệu: Chất độn (microcrystalline cellulose M112 - INS 460 (i)), chất làm trơn (magnesi stearat - INS 470 (iii)), vỏ nang (gelatin).

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ hoạt huyết, tăng tuần hoàn máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ xây xẩm mặt mày do lưu thông máu kém. Hỗ trợ giảm nguy cơ tắc mạch, đột quỵ do huyết khối.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người hay xây xẩm mặt mày do lưu thông máu kém.

Người có nguy cơ đột quỵ, tắc mạch do cục máu đông.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần: sáng 1 viên, tối 2 viên.

Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 10,2 g (Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng)

Hộp 30,6 g (Hộp 1 chai x 90 viên nang cứng)

THỜI HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản phẩm.

CẢNH BÁO:

Không dùng cho người máu chậm đông, người đang chảy máu cấp tính, người chuẩn bị phẫu thuật, phụ nữ rong kinh, phụ nữ có thai và đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi. Sản phẩm không chứa isoflavon nên dùng được cho những người có khuyến cáo không nên sử dụng các sản phẩm từ đậu nành có chứa isoflavon.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: (0292) 3891433 | Fax: (0292) 3895209

www.dhgpharma.com.vn - Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn