

NEOTOPASE

Thành phần:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Pancreatin.....170 mg

Simethicone.....84,433 mg

Các thành phần khác vừa đủ 1 viên.

Cơ chế tác dụng:

Viên nén bao phim NEOTOPASE là kết hợp giữa pancreatin và simethicone:

Pancreatin có chứa các men: protase, lipase, amylase.

Đây là những men xúc tác quá trình chuyển hóa thức ăn thành những chất đơn giản giúp cho việc hấp thu, tiêu hóa dễ dàng hơn (như protase chuyển protein thành peptides và proteose, amylase chuyển hóa tinh bột thành đường và dextrin, lipase chuyển hóa chất béo thành glycerol và acid béo).

Simethicone làm giảm sức căng bề mặt nên phá bọt khí ở dịch tiêu hóa khi bị rối loạn. Simethicone làm giảm đầy hơi và bụng khó chịu do khí dư trong rối loạn như rối loạn tiêu hóa và trào ngược dạ dày.

Công dụng:

Giúp chuyển hóa thức ăn, hỗ trợ điều trị đầy hơi, chướng bụng, ăn khó tiêu.

Đối tượng sử dụng:

Dùng cho người ăn khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng.

Liều lượng – cách dùng:

Cách dùng: dùng uống, uống nguyên viên không được bẻ viên hay nhai viên. Uống sau bữa ăn hoặc khi có triệu chứng khó tiêu, đầy hơi.

Người lớn: 1 – 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 7 đến 14 tuổi: uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Qui cách đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất, không dùng khi quá hạn sử dụng.

Lưu ý:

Tránh dùng sản phẩm cung cấp enzyme cho phụ nữ có thai và cho con bú.

“Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.”

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất: BOSTON PHARMA

43 đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ: (0650) 3.769. 606. Email: boston@bostonpharma.com.vn.