

Thực phẩm chức năng

PEPLIAZ

Viên nén sủi

Thành phần:

Mỗi viên nén sủi bột chứa:

| | |
|--------------------------|-------|
| Papain..... | 60 mg |
| Fungal Diatase | 20 mg |
| (Alpha-amylase (1:2000)) | |
| Simethicone..... | 25 mg |
| Taurine..... | 10 mg |
| Lysin hydroclorid..... | 15 mg |

Tá dược vơ

Cơ chế tác dụng:

- Alpha-amylase là một men thủy phân các phức hợp polysaccharide carbohydrate như tinh bột, glycogen và các sản phẩm thoái hóa biến của chúng thành các disaccharides đơn giản hơn.
- Papain là một men tiêu đạm có trong trái đu đủ xanh Caria Papaya. Nó là một hỗn hợp bao gồm papain và chymopapain, các men tiêu hóa đạm thủy phân polypeptides, amides và esters, đặc biệt tại các liên kết liên quan đến các acid amin cơ bản như leucin hay glycin, tạo thành các peptid có trọng lượng phân tử thấp.
- Simethicone làm giảm sức căng bề mặt của các bong bóng hơi trong dạ dày, làm chúng hợp thành khối khí, thoát hơi ra ngoài và giảm chướng bụng.

Công dụng:

Giúp làm giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, biếng ăn, ăn không ngon, giúp kích thích tiêu hóa.

Chống chỉ định:

Người có tiền sử quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Đối tượng sử dụng:

Người ăn uống không tiêu, bị đầy hơi.

Cách dùng:

Uống 1 viên x 2 - 3 lần / ngày sau các bữa ăn.

Hòa tan viên vào một cốc nước lạnh.

Quy cách đóng gói:

Hộp 4 vỉ x 4 viên/ Hộp 10 vỉ x 4 viên.

Hạn sử dụng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Lưu ý:

- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ số điện thoại 08-37908860.