

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
UBINUTRO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

THÀNH PHẦN:

Mỗi lọ siro chứa:

Vitamin B1	20 mg
Vitamin B2	20 mg
Vitamin B6	20 mg
Vitamin PP	18 mg
Kẽm	30 mg
Lysine hydroclorid	900 mg
Tá dược vừa đủ	90 ml

DẠNG BÀO CHẾ: Siro thuốc

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 90ml, hộp 1 lọ 120ml, hộp 1 lọ 150ml

CHỈ ĐỊNH:

- Cung cấp acid amin, vitamin và kẽm trong các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, còi xương, chậm lớn.
- Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khoẻ nhanh chóng trong các trường hợp mệt mỏi, kiệt sức sau bệnh, rối loạn tiêu hoá.
- Dùng cho trẻ em và thiếu niên trong thời kỳ tăng trưởng phát triển, trong giai đoạn học hành căng thẳng cần bổ sung nhu cầu cao về vitamin và acid amin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Do trong công thức có Vitamin PP nên khi sử dụng đồng thời với chất ức chế men

khử HGM- CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân. Sử dụng đồng thời với thuốc chẹn Alpha-adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức. Khẩu phần ăn và/hoặc thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với UBINUTRO. Sử dụng đồng thời với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc cho gan. Không nên dùng đồng thời UBINUTRO với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính.

- Không dùng đồng thời với Levodopa vì Vitamin B6 ức chế tác dụng của Levodopa.
- Probenecid sử dụng cùng vitamin B2 gây giảm hấp thu vitamin B2 ở dạ dày, ruột.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Không có tác dụng phụ đáng kể nào với liều dùng đã khuyến cáo. Thỉnh thoảng gặp một vài tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa như đầy hơi, nôn, buồn nôn hay đỏ da, nổi ngứa. Khi gặp các triệu chứng trên tốt nhất hỏi ý kiến thầy thuốc.

Ghi chú: “*Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*”.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 1 – 5 tuổi: uống 5 ml/lần x 1 lần/ngày.

Trẻ em trên 5 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lần/ngày.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. Nếu thấy thuốc biến màu hoặc có hiện tượng khác lạ thì phải báo cho nhà sản xuất biết.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.



NAMHA PHARMA

Nhà sản xuất :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: 0228 3649408 - Fax: 0228 3644650