



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GMP-WHO

Silymax[®] Complex

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Thành phần công thức cho 1 viên nang cứng:

Thành phần hoạt chất:

Cao khô <i>Carduus marianus</i> (tương đương Silymarin toàn phần 70 mg)	140 mg
Cao khô Diệp hạ châu (<i>Extractum Herba Phyllanthi urinariae</i>) (tương ứng với 1400 mg dược liệu Diệp hạ châu)	200 mg
Cao khô Ngũ vị tử (<i>Extractum Fructus Schisandrae</i>) (tương ứng với 150 mg dược liệu Ngũ vị tử)	25 mg
Cao khô Nhân trần (<i>Extractum Herba Adenosmatis caerulei</i>) (tương ứng với 714,5 mg Nhân trần)	50 mg
Curcuminoids (chiết xuất từ Nghệ (<i>Curcuma longa</i> L.))	25 mg

Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột sắn, magnesi stearat, talc.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Viên nang cứng số 0, màu xanh - xanh, bên trong chứa bột thuốc màu vàng nâu, mùi thơm đặc trưng của dược liệu.

Chỉ định:

Viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao.

Các trường hợp suy giảm chức năng gan, rối loạn chức năng gan với các biểu hiện như dị ứng, mẩn ngứa, mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa.

Phòng và điều trị tổn thương gan do rượu, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...).

Liều dùng, cách dùng:

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên/ lần x 2 - 3 lần /ngày.

Không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Cách dùng: Dùng đường uống.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với các thành phần thuốc.

Tắc mật hoàn toàn, suy tể bào gan nặng.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng silymarin cho trẻ em, không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Thuốc có chứa lactose, bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm

gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng cao *Carduus marianus* cho phụ nữ có thai và cho con bú. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy

móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Chưa có thông tin về các tương tác thuốc

Tác dụng không mong muốn (ADR) của thuốc:

Hiếm gặp, 1/1000 > ADR \geq 1/10000

- Da: Phản ứng dị ứng nhẹ

- Tiêu hóa: Tiêu chảy

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin.

Tác dụng:

Carduus marianus (Milk thistle) chứa silymarin là hỗn hợp các flavonolignan bao gồm silybin, silycristin và silydianin, trong đó thành phần chính là silybin. Silymarin giúp bảo vệ tế bào gan do có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự peroxid hóa lipid và tăng cường giải độc gan. Silymarin còn có tác dụng chống viêm, tăng tổng hợp protein của tế bào gan do đó kích thích sự phục hồi và tái tạo các tế bào gan.

Diệp hạ châu có tác dụng ức chế sự phát triển của virus viêm gan siêu vi B do ức chế DNA polymerase, một loại enzym cần thiết cho sự sinh sản của virus viêm gan B. Do đó được dùng để điều trị viêm gan cấp tính hay mạn tính.

Ngũ vị tử có thành phần lignan giúp tái tạo các nhu mô gan bị tổn thương do viêm gan siêu vi hoặc do rượu. Lignan làm giảm nồng độ men SGPT, giúp ức chế các yếu tố kích hoạt tiểu cầu - tác nhân thúc đẩy hiện tượng viêm trong một số tình huống.

Curcumin là thành phần có tác dụng chính của curcuminoids – một hỗn hợp các chất chiết được từ củ nghệ (*Curcuma longa* L.). Curcumin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có tác dụng bảo vệ gan chống lại tổn thương gốc tự do. Curcumin còn có tác dụng tốt lên các rối loạn tiêu hóa có liên quan đến chức năng gan mật.

Nhân trần có tác dụng tăng tiết mật và tăng thải độc gan.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 6 vỉ x 10 viên. Vỉ PVC/nhôm.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: 356 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội



Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT
Đ/c: Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội