



CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG

Ngày uống 2-3 lần, uống trước bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 4 thìa cà phê (20ml)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Đại, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Đại, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

Siro

**BỔ TỶ
P/H**



PHUC HUNG

Siro

**BỔ TỶ
P/H**



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Hộp 1 lọ x 90ml

Thành phần

Mỗi lọ 90ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 84,6g dược liệu đã qua chế biến gồm:

ĐANG SÂM	13,5g
BẠCH LINH	9g
BẠCH TRUẬT	13,5g
CÁT CẢNH	10,8g
MẠCH NHA	9g
CAM THẢO	5,4g
LONG NHÂN	5,4g
TRẦN BÌ	3,6g
LIÊN NHỤC	3,6g
SA NHÂN	3,6g
SỨ QUÂN TỬ	3,6g
BÁN HẠ	3,6g
TÁ DƯỢC	vỏ 90ml



CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG

PHUC HUNG

Siro

**BỔ TỶ
P/H**

Lọ 90ml

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

SĐK :

Chỉ định: Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

THÀNH PHẦN

Mỗi lọ 90ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 84,6g dược liệu đã qua chế biến gồm:

ĐANG SÂM	13,5g
BẠCH LINH	9g
BẠCH TRUẬT	13,5g
CÁT CẢNH	10,8g
MẠCH NHA	9g
CAM THẢO	5,4g
LONG NHÂN	5,4g
TRẦN BÌ	3,6g
LIÊN NHỤC	3,6g
SA NHÂN	3,6g
SỨ QUÂN TỬ	3,6g
BÁN HẠ	3,6g
TÁ DƯỢC	vỏ 90ml

TIÊU CHUẨN : TCCS

BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :



PHUC HUNG

Siro

**BỔ TỶ
P/H**



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Hộp 1 lọ x 90ml



Handwritten signature

Siro
BỔ TỶ P/H

CHỈ ĐỊNH:
Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG
Ngày uống 2-3 lần, uống trước bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 4 thìa cà phê (20ml)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

 **PHUC HUNG**

Siro
BỔ TỶ P/H



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Hộp 1 lọ x 100ml

Thành phần
Mỗi lọ 100ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 94g dược liệu đã qua chế biến gồm:

ĐANG SÂM	15g
BẠCH LINH	10g
BẠCH TRUẬT.....	15g
CÁT CÀNH.....	12g
MẠCH NHA	10g
CAM THẢO	6g
LONG NHÃN	6g
TRẦN BÌ	4g
LIÊN NHỤC	4g
SA NHÂN	4g
SỮ QUẦN TỬ	4g
BÁN HẠ	4g
TÁ DƯỢC	vđ 100ml

 **PHUC HUNG**

Siro
BỔ TỶ P/H Lọ 100ml

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

SDK : _____

Chỉ định: Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

Số lô SX: _____
Ngày SX: _____
HD : _____

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

THÀNH PHẦN
Mỗi lọ 100ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 94g dược liệu đã qua chế biến gồm:

ĐANG SÂM	15g
BẠCH LINH	10g
BẠCH TRUẬT.....	15g
CÁT CÀNH.....	12g
MẠCH NHA	10g
CAM THẢO	6g
LONG NHÃN	6g
TRẦN BÌ	4g
LIÊN NHỤC	4g
SA NHÂN	4g
SỮ QUẦN TỬ	4g
BÁN HẠ	4g
TÁ DƯỢC	vđ 100ml

TIÊU CHUẨN : TCCS
BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C

SDK : _____
Số lô SX: _____
Ngày SX: _____
HD : _____


 **PHUC HUNG**

Siro
BỔ TỶ P/H



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Hộp 1 lọ x 100ml



Thành phần
Mỗi lọ 125ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 117,5g dược liệu đã qua chế biến gồm:

ĐANG SÂM	18,75g
BẠCH LINH	12,5g
BẠCH TRUẬT.....	18,75g
CÁT CÀNH	15g
MẠCH NHA	12,5g
CAM THẢO	7,5g
LONG NHÂN	7,5g
TRẦN BÌ	5g
LIÊN NHỤC	5g
SA NHÂN	5g
SỮ QUẦN TỬ	5g
BÁN HÀ	5g
TÁ DƯỢC	vỏ 125ml



CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Siro
**BỔ TỶ
P/H**

Lọ 125ml

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

SĐK :

Chỉ định: Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG

Ngày uống 2-3 lần, uống trước bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 4 thìa cà phê (20ml)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04 33826222 * Fax: 04 33978024



PHUC HUNG

Siro
**BỔ TỶ
P/H**



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Hộp 1 lọ x 125ml

THÀNH PHẦN

Mỗi lọ 125ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 117,5g dược liệu đã qua chế biến gồm:

ĐANG SÂM	18,75g
BẠCH LINH	12,5g
BẠCH TRUẬT.....	18,75g
CÁT CÀNH	15g
MẠCH NHA	12,5g
CAM THẢO	7,5g
LONG NHÂN	7,5g
TRẦN BÌ	5g
LIÊN NHỤC	5g
SA NHÂN	5g
SỮ QUẦN TỬ	5g
BÁN HÀ	5g
TÁ DƯỢC	vỏ 125ml



PHUC HUNG

Siro
**BỔ TỶ
P/H**



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Hộp 1 lọ x 125ml

TIÊU CHUẨN: TCCS

BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SIRO BỔ TỶ P/H

Thành phần: (cho 1 lọ)

Thành phần	Lọ 90ml: Mỗi lọ 90ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 84,6g dược liệu đã qua chế biến gồm:	Lọ 100ml: Mỗi lọ 100ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 94g dược liệu đã qua chế biến gồm:	Lọ 125ml: Mỗi lọ 125ml siro chứa cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 117,5g dược liệu đã qua chế biến gồm:
Đảng sâm, (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	13,5g	15g	18,75g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	9g	10g	12,5g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	13,5g	15g	18,75g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	10,8g	12g	15g
Mạch nha (<i>Fructus Hordei germinatus</i>)	9g	10g	12,5g
Cầm nhão (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	5,4g	6g	7,5g
Long nhãn (<i>Arillus Longan</i>)	5,4g	6g	7,5g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae</i>)	3,6g	4g	5g
Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis</i>)	3,6g	4g	5g
Sa nhân (<i>Fructus Amomi</i>)	3,6g	4g	5g
Sử quân tử (<i>Semen Quisqualis</i>)	3,6g	4g	5g
Bán hạ (<i>Rhizoma Typhonii trilobati</i>)	3,6g	4g	5g
Tá dược (natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	vừa đủ 90ml	vừa đủ 100ml	vừa đủ 125ml

Dạng bào chế: Siro thuốc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 90ml; 100ml; 125ml.

Chỉ định:

Kích thích tiêu hóa, dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 - 3 lần, uống trước bữa ăn:
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml).
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml).
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 4 thìa cà phê (20ml).

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

TU. CỤC TRƯỞNG

TR. PHÒNG

TR. PHÒNG

TR. PHÒNG

TR. PHÒNG

TR. PHÒNG