

CHỈ ĐỊNH: TÁO KẾT HOÀN P/H có tác dụng nhuận tràng, sinh tân, tư bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Điều trị táo bón cho mọi lứa tuổi.
- Can thận âm hư gây chóng mặt, vàng đầu, u tai, đau lưng, mỏi gối, mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát, thị lực giảm sút.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN: Cho 1 hoàn mềm: Bột Thực địa: 50mg; Bột Hoài sơn: 40mg; Bột Bạch linh: 30mg; Bột Vừng đen: 30mg; Cao đặc dược liệu: 30mg (Cường dương với Thực địa: 20mg; Sơn thù: 40mg; Mẫu đơn bì: 30mg; Trạch tả: 30mg; Nhục thung dung: 30mg; Ngưu tất: 30mg); Tã được vò 1 viên.

SĐK (Reg. No.):
Số lô SX (lot. No.):
Ngày SX (Mfg. Date):
HĐ (Exp. Date):

CÔNG TY TNHH DÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

KT: 128x 48 (mm)

CHỈ ĐỊNH:
TÁO KẾT HOÀN P/H có tác dụng nhuận tràng, sinh tân, tư bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Điều trị táo bón cho mọi lứa tuổi.
- Can thận âm hư gây chóng mặt, vàng đầu, u tai, đau lưng, mỏi gối, mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát, thị lực giảm sút.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Ngày uống 2-3 lần, uống sau bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 5-10 viên.
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 viên.
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20-25 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Táo Kết Hoàn P/H

- Nhuận Trạng
- Tư Bổ Can Thận

Hộp 1 lọ x 240 viên hoàn mềm

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Thực địa	50mg
Bột Hoài sơn	40mg
Bột Bạch linh	30mg
Bột Vừng đen	30mg
Cao đặc dược liệu	30mg

Tương đương với:

Thực địa	20mg
Sơn thù	40mg
Mẫu đơn bì	30mg
Trạch tả	30mg
Nhục thung dung	30mg
Ngưu tất	20mg
Tã được vò	1 viên

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SĐK (Reg. No.):
Số lô SX (lot. No.):
Ngày SX (Mfg. Date):
HĐ (Exp. Date):

CÔNG TY TNHH DÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thành Đạt, xã Bạch Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.83.829.222 * Fax: 04.3.397.8024

Táo Kết Hoàn P/H

- Nhuận Trạng
- Tư Bổ Can Thận

Hộp 1 lọ x 240 viên hoàn mềm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 06-02-2017

KT: 53 x 53 x 83 (mm)



458/12/157

PHUC HUNG

CHỈ ĐỊNH: TÁO KẾT HOÀN P/H có tác dụng nhuận tràng, sinh tân, tư bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Điều trị táo bón cho mọi lứa tuổi.
- Can thận âm hư gây chóng mặt, vàng đầu, ù tai, đau lưng, mỏi gối, mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát, thị lực giảm sút.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN: Cho 1 hoàn mềm: Bột Thực địa: 30mg; Bột Hoài sơn: 40mg; Bột Bạch linh: 30mg; Bột Vừng đen: 30mg; Cao đặc được điều: 30mg (Đương quy: 15mg; Thục địa: 20mg; Sơn thù: 40mg; Mẫu đơn bì: 30mg; Trạch tả: 30mg; Ngưu tất: 20mg); Tá dược: 30mg; Nguội tất: 20mg; Tá dược: 1 viên.

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (lot. No.):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

CÔNG TY TNHH DÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

KT: 128x 48 (mm)

CHỈ ĐỊNH:
TÁO KẾT HOÀN P/H có tác dụng nhuận tràng, sinh tân, tư bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Điều trị táo bón cho mọi lứa tuổi.
- Can thận âm hư gây chóng mặt, vàng đầu, ù tai, đau lưng, mỏi gối, mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát, thị lực giảm sút.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Ngày uống 2-3 lần, uống sau bữa ăn:
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 5-10 viên.
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 viên.
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20-25 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

PHUC HUNG

Táo Kết Hoàn P/H

- Nhuận Tràng
- Tư Bổ Can Thận

Hộp 1 lọ x 480 viên hoàn mềm

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Thực địa	50mg
Bột Hoài sơn	40mg
Bột Bạch linh	30mg
Bột Vừng đen	30mg
Cao đặc được điều	30mg
Tương đương với:	
Thực địa	20mg
Sơn thù	40mg
Mẫu đơn bì	30mg
Trạch tả	30mg
Nhục, thung đượng	30mg
Ngưu tất	20mg
Tá dược	vd 1 viên

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (lot. No.):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

CÔNG TY TNHH DÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Văn Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978324

PHUC HUNG

Táo Kết Hoàn P/H

- Nhuận Tràng
- Tư Bổ Can Thận

Hộp 1 lọ x 480 viên hoàn mềm

KT: 53 x 53 x 83 (mm)



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

TÁO KẾT HOÀN P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Thục địa (<i>Pulveres radices rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	: 50mg
Bột Hoài sơn (<i>Pulveres tuberis dioscoreae persimilis</i>)	: 40mg
Bột Bạch linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 30mg
Bột Vừng đen (<i>Pulveres semensis sesami</i>)	: 30mg
Cao đặc dược liệu (<i>Extractum</i>)	: 30mg
Tương đương với:	
Thục địa (<i>Radix rehmanniae glutinosae</i>)	: 20mg
Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>)	: 40mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex paeoniae suffruticosae</i>)	: 30mg
Trạch tả (<i>Rhizoma alismatis</i>)	: 30mg
Nhục thung dung (<i>Herba cistanches</i>)	: 30mg
Ngưu tất (<i>Radix achyranthis bidentatae</i>)	: 20mg
Tả dược (mật ong, nước tinh khiết)	: vừa đủ 1 viên



Dạng bào chế: Hoàn mềm.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 240 viên; hộp 1 lọ x 480 viên.

Chỉ định:

- Táo kết hoàn P/H có tác dụng nhuận tràng, sinh tân, tư bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp:
- Điều trị táo bón cho mọi lứa tuổi.
 - Can thận âm hư gây chóng mặt, váng đầu, ù tai, đau lưng, mỏi gối, mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát, thị lực giảm sút.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 5 - 10 viên.
 - Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20 viên.
 - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20 - 25 viên.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, băng huyết.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho người hư hàn, đại tiện lỏng nát.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.
Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng