

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 06-02-2017

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



Chỉ định: Ôn bổ khí huyết.
Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, đổ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.
Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Cách dùng và liều dùng:
- Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước bữa ăn.
- Đạt hiệu trị 6 - 8 tuần, có thể dùng thường xuyên

Thành phần: (cho 1 hoàn mềm):
Bột Bạch thực 0,7g; Bột Bạch truat 1g; Bột Cam thảo 0,3g; Bột Đường quy 0,9g; Bột Phục linh 0,7g; Bột Quế nhục 0,1g; Bột Thực địa 0,9g; Bột Xuyên khung 0,3g; Cao đặc Đảng sâm 0,3g (tương đương với 1g dược liệu); Cao đặc Hoàng kỳ 0,3g (tương đương với 1g dược liệu); Mật ong vơ 9g

Thành phần: (cho 1 hoàn mềm):
Bột Bạch thực 0,7g; Bột Bạch truat 1g; Bột Cam thảo 0,3g; Bột Đường quy 0,9g; Bột Phục linh 0,7g; Bột Quế nhục 0,1g; Bột Thực địa 0,9g; Bột Xuyên khung 0,3g; Cao đặc Đảng sâm 0,3g (tương đương với 1g dược liệu); Cao đặc Hoàng kỳ 0,3g (tương đương với 1g dược liệu); Mật ong vơ 9g

Chỉ định: Ôn bổ khí huyết.
Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, đổ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.
Tiêu chuẩn: TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XATẤM TAY TRẺ EM

Chỉ định: Ôn bổ khí huyết.
Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, đổ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.
Tiêu chuẩn: TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XATẤM TAY TRẺ EM

Chỉ định: Ôn bổ khí huyết.
Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, đổ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.
Tiêu chuẩn: TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XATẤM TAY TRẺ EM

Chỉ định: Ôn bổ khí huyết.
Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, đổ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.
Tiêu chuẩn: TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XATẤM TAY TRẺ EM

Chỉ định: Ôn bổ khí huyết.
Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, đổ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.
Tiêu chuẩn: TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XATẤM TAY TRẺ EM



THẬP TOÀN
ĐẠI BỔ P/H



THẬP TOÀN
ĐẠI BỔ P/H
- ÔN BỔ KHÍ HUYẾT -

Hộp 10 hoàn mềm x 9g



CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ P/H

Thành phần: (cho 1 hoàn mềm)

Bột Bạch thược (<i>Pulveres radices paeoniae lactiflorae</i>)	: 0,7g
Bột Bạch truật (<i>Pulveres rhizomae atractylodis macrocephalae</i>)	: 1g
Bột Cam thảo (<i>Pulveres radices glycyrrhizae</i>)	: 0,3g
Bột Đường quy (<i>Pulveres radices angelicae sinensis</i>)	: 0,9g
Bột Phục linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 0,7g
Bột Quế nhục (<i>Pulveres corticis cinnamomi</i>)	: 0,1g
Bột Thực địa (<i>Pulveres radices rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	: 0,9g
Bột Xuyên khung (<i>Pulveres rhizomae ligustici wallichii</i>)	: 0,3g
Cao đặc Đảng sâm (<i>Extractum radices codonopsis pilosulae</i>)	: 0,3g
(tương đương với 1g dược liệu)	
Cao đặc Hoàng kỳ (<i>Extractum radices astragali membranacei</i>)	: 0,3g
(tương đương với 1g dược liệu)	
Mật ong (<i>Mel</i>)	: vừa đủ 9g



Dạng bào chế: Hoàn mềm.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 9g.

Chỉ định:

Ôn bổ khí huyết. Chủ trị: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân không ấm.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước bữa ăn.
- Đợt điều trị 6 - 8 tuần, có thể dùng thường xuyên.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Lỗ Minh Hùng