

Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

Lần đầu: 1 4 2013

ALASCANE
Ginkgo biloba Extract 80mg



30 Capsules

Manufactured by:
HD PHARMA
Số 10 Lương Định Của - Phường 10 - Quận 10 - TP. HCM
Tel: 0903 100 000

2- Nhãn vỉ:

ALASCANE
Ginkgo biloba Extract 80mg

Manufactured by: HD PHARMA
Số 10 Lương Định Của - Phường 10 - Quận 10 - TP. HCM
Tel: 0903 100 000

Số lô sản: HD:

THÀNH PHẦN/ COMPOSITION:
Cao bạch quả (Ginkgo Biloba Extract)..... 80mg
Tá dược:..... vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC/ TREATMENT, CONTRAINDICATION,
DOSAGE - ADMINISTRATION and OTHER INFORMATION:
Xem kỹ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. Please see the insert paper

ALASCANE
Ginkgo biloba Extract 80mg



30 Viên nang mềm

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VIỆT HẢI DƯƠNG
Số 10 Lương Định Của - Phường 10 - Quận 10 - TP. HCM
Tel: 0903 100 000

TIÊU CHUẨN/ QUALITY SPECIFICATION
TCCS / Manufacturer's specification.

BẢO QUẢN / Storage: Nơi khô ráo, nhiệt độ
không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp
/Store in a dry place, temperature not exceeding
30°C, Protect from light.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM / KEEP OUT OF
REACH OF CHILDREN / ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG THUỐC / READ INSTRUCT
PAPER CAREFULLY BEFORE USING.

SUN:
LSC:
NSX:
HSD:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ALASCANE

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao Bạch quả (*Ginkgo biloba extract*)

80 mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Green Svd 1 viên.)

Chỉ định:

- Thiếu năng tuần hoàn não: Suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai, nhức đầu.

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: Hội chứng Raynaud, chứng đi cách hồi, chứng xanh tím đầu chi, hội chứng sau viêm tĩnh mạch. Rối loạn hệ thống tiền đình và ốc tai.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

Thận trọng

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết.

Tác dụng không mong muốn:

Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày.

Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: 1 viên/lần. Ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 1 viên.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác:

Không dùng đồng thời với thuốc chống máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chi huyết.



Quá liều và xử trí :

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn.
Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 3 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102-Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853.848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

A small, stylized blue signature mark located at the bottom right of the page.