

MẪU HỘP DUNG DỊCH UỐNG BETASIPHON
Chai 120 ml

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 05 / 09 / 2016

Thy

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP. HỒ CHÍ MINH
NHÀ MÁY: 930 C4, ĐƯỜNG C, KCN CÁT LÁI, GIỚI THỦY
P. THẠNH MỸ LỢI, Q. 7, TP. HCM


Betasiphon
dung dịch uống

Oral Solution

Betasiphon

Bottle of 120ml

-  **DIURETIC**
-  **CHOLERETIC**
-  **DIGESTIVE STIMULATION**



CÔNG THỨC:
Cao lỏng Râu mèo 24ml
(tương ứng 24g dược liệu Râu mèo (*Herba Orthosiphonis spiralis*))
Cao lỏng Actiso 57.6ml
(tương ứng 57.6g dược liệu Actiso (*Folium Cynarae scolymii*))
Tá dược vd 1 chai 120ml

CHỈ ĐỊNH:
- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật, Viêm gan.
- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu.

LIỀU DÙNG:
Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5ml), ngày 3 - 4 lần.
Trẻ em: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5ml), ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS
SDK:
Số lô SX/Lot: HDV Exp:
NSX/Mfg:

Dung dịch uống

Betasiphon

Chai 120ml

-  **LỢI TIỂU**
-  **LỢI MẬT**
-  **KÍCH THÍCH TIÊU HÓA**



Ngày 22 tháng 4 năm 2016
Tổng Giám Đốc
P. TÔNG GIÁM ĐỐC
2-9
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Bùi Ngọc Hằng

MẪU NHÃN CHAI DUNG DỊCH UỐNG BETASIPHON


Chai 120ml

Dung dịch uống

Betasiphon

LỢI TIỂU
LỢI MẬT
KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

Chai 120ml



CÔNG THỨC: Cao lỏng Râu mèo 24ml (tương ứng 24g dược liệu Râu mèo (*Herba Orthosiphonis spiralis*))
Cao lỏng Actiso 57,6ml (tương ứng 57,6g dược liệu Actiso (*Folium Cynarae scolymii*))
Tá dược vờ 1 chai 120ml

CHỈ ĐỊNH:
- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận, Viêm túi mật, sỏi mật, Viêm gan.
- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu.

LIỀU DÙNG: Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5ml), ngày 3 - 4 lần.
Trẻ em: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5ml), ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng
Sản xuất theo TCCS ĐKK:
Số lô SX/Lot: HD/Exp.
NSX/ Mfg:

THY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP. HỒ CHÍ MINH
NHÀ MÁY: 9/30 CK, Đường C, KCN Cát Lái, Quận 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

Ngày 22 tháng 4 năm 2016



DS. Bùi Ngọc Hằng

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH UỐNG BETASIPHON CHAI 120 ml

BETASIPHON

Dung dịch uống

CÔNG THỨC:
 Cao lỏng Râu mèo 24 ml
 (tương ứng 24 g dược liệu Râu mèo (*Herba Orthosiphonis spiralis*))
 Cao lỏng Actisô 57,6 ml
 (tương ứng 57,6 g dược liệu Actisô (*Folium Cynarae scolymii*))
 Tá dược: Đường trắng, methyl hydroxybenzoat,
 propyl hydroxybenzoat, caramel bột, ethanol 96%,
 nước tinh khiết vừa đủ 120 ml

CHỈ ĐỊNH:
 - Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêm gan.
 - Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.
 - Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 - Nghẽn đường mật, suy tế bào gan.
 - Đái tháo đường, thào nhạt, suy thận.
 - Người huyết áp thấp và phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG:
 Trường hợp bị tiêu chảy hay đau bụng nên gián đoạn việc dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
 Do tác dụng lợi tiểu (cao lỏng Actisô, cao lỏng Râu mèo) nên Betasiphon có thể rút ngắn thời gian đi chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của các thuốc uống cùng, vì vậy nên uống cách xa những thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
 - Thời kỳ mang thai: Thuốc có thể gây tiêu chảy, đau bụng do đó phụ nữ mang thai không được dùng.
 - Thời kỳ cho con bú: Thuốc có thể gây rối loạn nước và điện giải khi dùng quá liều. Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:
 Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy.
 Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tính dược lực học:
 - Cao lỏng Actisô: Có tác dụng lợi mật, tăng thải trừ các chất thải của mật, giảm cholesterol trong máu, giảm urê-máu, giảm lipid-máu, giúp bảo vệ gan, lợi tiểu.
 - Cao lỏng Râu mèo: Có tác dụng làm tăng lượng bài tiết nước tiểu, tăng thải trừ urê, acid uric, clorua, sắc tố mật, không độc có thể dùng lâu dài không gây tác dụng phụ. Được dùng làm thuốc lợi tiểu, giải độc trong các bệnh đường tiết niệu, sỏi niệu, giúp tiêu hóa, giúp giải độc trong các bệnh gan mật và ngoài da.
 - Betasiphon phối hợp cao lỏng Actisô, cao lỏng Râu mèo được chiết xuất từ dược liệu thiên nhiên, có tác dụng lợi tiểu, lợi mật, kích thích tiêu hóa, cải thiện chức năng bài tiết của gan và thận.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
 Rối loạn nước và điện giải. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình:
 - Người lớn: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5 ml), ngày 3 - 4 lần.
 - Trẻ em: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5 ml), ngày 2 lần.

Trình bày: Hộp 1 chai 120 ml
Điều kiện bảo quản:
 Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
Sản xuất: Theo TCCS

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
 NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SĨ**



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM
 ĐT: (08) 38687355. FAX: 84.8.38687356
 NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM

Thy

Ngày 21 tháng 4 năm 2016
 TỔNG GIÁM ĐỐC ml
 P. TỔNG GIÁM ĐỐC



TU. CỤC TRƯỞNG
 P. TRƯỞNG PHÒNG
 Đỗ Minh Hùng