

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 05/09/2016

GMP
WHO

www.vacopharm.com

Rx Prescription drug

D-contrisine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE

SDK
Số lô SX
Ngày SX
HD





THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

R Prescription drug

D-contrisine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE

SDK	:
Số lô SX	:
Ngày SX	:
HD	:



R_x Prescription Group

D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN – STIFF NECK – SPASTIC STATE

SDK
Số lờ SX
Ngày SX
HD



Rx Prescription drug

D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Rx Prescription drug

D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE





Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.yacopharm.com

HD



Rx Prescription drug

D-contrinesin 250mg

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE

R_x Prescription Group

D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN – STIFF NECK – SPASTIC STATE

Ngày SX
HD







Prescription
drug


D-contresine 250

Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN – STIFF NECK – SPASTIC STATE

10 BLISTERS X 25 FILM COATED TABLETS





R Prescription Group

D-contresine 250

Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE



SDK
Số lô SX
Ngày SX
HD



R_x Prescription drug

D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE



Rx Prescription drug

D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE



R_x Prescription drug


D-contresine 250

Mephenesin 250mg

MUSCLE RELAXANT

BACK PAIN - STIFF NECK - SPASTIC STATE

SĐK
Số lô SX
Ngày SX
HD



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vì 10 viên



Nhãn vì 25 viên



Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 250mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3 lần. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

D-contrisine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIẢN CƠ

ĐAU LƯNG – CỔ CỨNG – TÌNH TRẠNG CƠ THẮT

100 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK
Số lô SX
Ngày SX
HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT (072) 3.829.311 • Fax (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 250mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3 lần. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

ĐAU LƯNG – CỔ CỨNG – TÌNH TRẠNG CƠ THẮT

200 VIÊN NÉN BAO PHIM

Avacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 300 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 250mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3 lần. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

ĐAU LƯNG – CỔ CỨNG – TÌNH TRẠNG CƠ THẮT

300 VIÊN NÉN BAO PHIM

Avacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 500 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 250mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3 lần. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

ĐAU LƯNG – CỔ CỨNG – TÌNH TRẠNG CƠ THẮT

500 VIÊN NÉN BAO PHIM

Avacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 250mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3 lần. Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

ĐAU LƯNG – CỔ CỨNG – TÌNH TRẠNG CƠ THẮT

1000 VIÊN NÉN BAO PHIM

Avacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Rx Thuốc bán theo đơn

D-CONTRESINE 250

Thành phần

Mephenesin

250mg

Tá dược v.đ

1 viên nén bao phim

(Polyvinyl pyrrolidon K30, Canxi carbonat, Aerosil, Magnesi stearat, Croscarmellose natri, Natri starch glycolat, Talc, Opadry 200 pink, Đỏ Ponceau 4R)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 02 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 04 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 08 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 10 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
9	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 20 vỉ
10	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 40 vỉ
11	Ép vỉ, vỉ 25 viên, hộp 100 vỉ
12	Đóng chai 100 viên
13	Đóng chai 200 viên
14	Đóng chai 300 viên
15	Đóng chai 500 viên
16	Đóng chai 1000 viên

Được lực học

Mephenesin là thuốc thư giãn cơ có tác dụng Trung ương.

Mephenesin gây thư giãn cơ và trấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bế thần kinh cơ có tác dụng toàn thân và cũng có tác dụng tại nơi thuốc tiếp xúc. Lợi ích của thuốc bị hạn chế do thời gian tác dụng ngắn.

Được động học

Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết ở các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ.

Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi.

Chỉ định

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

Liều dùng và cách dùng

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3 lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Thận trọng

Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử dị ứng, hen phế quản, tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận.

Các tác dụng ngoại ý có thể tăng lên khi dùng cùng với rượu và các thuốc ức chế thần kinh Trung ương.

Người lái xe và vận hành máy móc cần lưu ý khi dùng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng.

Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.



Tác dụng không mong muốn : co giật, run rẩy, co cứng bụng, toát mồ hôi.

Thường gặp: mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động.

Ít gặp: đau khớp, đau người, bực tức, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, nổi mẩn, mất cảm giác ngon miệng, ảo giác kích động, có thể sốc phản vệ.

Hiếm gặp: dị ứng, ngứa gãi, phát ban.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của Mephenesin có thể tăng cường nếu trong thời gian dùng thuốc có uống rượu hoặc dùng các chất ức chế thần kinh khác.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê. Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già.

Điều trị: Trong tất cả các trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cẩn thận về hô hấp, mạch và huyết áp.

Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị có đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu.

Tiến hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ trợ chung, đảm bảo thông khí, truyền dịch. Cũng có thể điều trị ức chế thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thuốc điều trị thích hợp.

Trường hợp người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyển ngay đến cơ sở chuyên khoa.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.**

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lô Minh Hùng

Long An, ngày 04 tháng 01 năm 2016

KT.Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



K.S. Phan Thị Minh Thu