

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/8/2014

llh

DEEP RELIEF - NHÃN TUÝP





llh

DEEP RELIEF - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XIN ĐỌC KỸ ĐƠN NÀY TRƯỚC KHI DÙNG. GIỮ ĐƠN ĐỂ TRA CỨU KHI CẦN THIẾT.

TÁC ĐỘNG KÉP • GIẢM ĐAU NHANH



MENTHOLATUM
DEEP RELIEF

Thoa gel lên vùng da bị đau hoặc viêm và xoa bóp nhẹ nhàng, hoạt chất kháng viêm Ibuprofen thẩm sâu vào da kết hợp tinh dầu Menthol tác động trực tiếp lên vùng da cần điều trị, làm giảm cơn đau nhanh chóng.

ĐẶC TÍNH:

Gel Deep Relief với công thức phối hợp thành phần kháng viêm Ibuprofen (hoạt chất thuộc nhóm NSAIDs) và Menthol:

- Ibuprofen kháng viêm, giảm đau trong các cơn đau khớp, gân, dây chằng & cơ bắp.
- Tinh dầu Menthol tác động trực tiếp vào các dây thần kinh gây cảm giác mát lạnh và giảm đau nhanh.
- Đồng thời các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng công thức bào chế Deep Relief giúp tăng cường khả năng vận chuyển Ibuprofen qua da và phát huy tác dụng.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị tại chỗ viêm xương - khớp - cột sống và các khớp ngoại biên, viêm gân, viêm cơ, viêm quanh khớp, thoái hóa khớp. Viêm sau chấn thương nhẹ ở gân, cơ, dây chằng, khớp. Giảm đau trong đau vai, đau lưng, bong gân, đau do các chấn thương nhẹ ở cơ và mô mềm.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với Aspirin, các chất kháng viêm không Steroid (NSAIDs), hoặc một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ đang cho con bú hoặc trong 3 tháng cuối thai kỳ.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Bệnh nhân hen suyễn.
- Vết thương hở.

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:

Lấy một lượng thuốc thích hợp (1 - 4 cm), thoa lên vùng đau hoặc viêm, xoa bóp kỹ. Không thoa gel quá 3 lần/ngày và các lần thoa phải cách nhau trên 4 tiếng. Rửa tay sau khi thoa thuốc.

THÀNH PHẦN (TRONG 30 g):

Hoạt chất

Ibuprofen 1,50 g
l-Menthol 0,90 g

Tá dược: Ethanol, Propylene Glycol, Carbomer, Diisopropanolamine, Nước tinh khiết.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:

1. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng trong các trường hợp sau đây:

- Có tiền căn dị ứng với thuốc hay mỹ phẩm.
- Đang trong quá trình trị liệu.
- Phụ nữ có thai.
- Bệnh nhân loét đường tiêu hóa, tổn thương chức năng gan và thận nghiêm trọng, suy tim mãn tính.

2. Lưu ý trong và sau khi sử dụng:

- Không thoa quá liều.
- Đối với trẻ em, chỉ sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.
- Không thoa lên vùng da xung quanh mắt, niêm mạc mắt, da bị chàm, nhiễm độc hay vết thương hở. Nếu xảy ra, rửa kỹ với nước hay nước ấm. Nếu tình trạng trở nặng, xin ý kiến bác sĩ.
- Nếu các triệu chứng không thuyên giảm sau 2 tuần sử dụng thuốc, ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Chỉ sử dụng ngoài da.

3. Lưu ý sử dụng và bảo quản:

- Vặn chặt nắp tuýp sau khi sử dụng. Bảo quản nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp.
- Để tránh sử dụng nhầm lẫn và đảm bảo chất lượng, không chuyển thuốc này qua một vật dụng khác.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

- Thuốc có thể gây khô, đỏ, mẩn ngứa, rát da trong một số trường hợp. Nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, ngưng dùng thuốc và thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi thấy một trong các triệu chứng: khó thở, thở khô khè, phát ban, rộp da, bầm da hoặc đỏ ngứa, sưng phù mắt.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Khi dùng quá liều có thể gây đau đầu, chóng mặt, tụt huyết áp, nôn mửa. Nếu xảy ra, ngưng dùng thuốc và xin ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ, không sử dụng cùng lúc với các loại thuốc khác.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng (ghi trên nhãn thuốc).

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Dạng bào chế: gel thoa da.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 30 g.

TCCL: TCCS

Sản xuất bởi: **CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**
Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại liên lạc: 08 - 38229322

Trụ sở chính:

ROHTO PHARMACEUTICAL CO. LTD.
OSAKA, JAPAN

ROHTO
www.rohto.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng