

Dermabion®

Dexamethason - Clindamycin

Kem thoa da

CÔNG THỨC

Cho tuýp 10 g:

Dexamethason acetat.....5,0 mg

Clindamycin.....100 mg

(dưới dạng clindamycin phosphat)

Tá dượcvừa đủ 10 g

Cho lọ 8 g:

Dexamethason acetat.....4,0 mg

Clindamycin.....80 mg

(dưới dạng clindamycin phosphat)

Tá dượcvừa đủ 8 g

(Lanette E, sepineo, methyl parahydroxybenzoat, propyl parahydroxybenzoat, propylen glycol, eutanol G)

DẠNG TRÌNH BÀY

Thuốc kem. Hộp 1 tuýp 10 g. Hộp 1 lọ 8 g.

DƯỢC LỰC HỌC

- Dexamethason là glucocorticoid tổng hợp có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, còn tác dụng đến cân bằng điện giải thì rất ít. Về hoạt lực chống viêm dexamethason mạnh hơn hydrocortison 30 lần, mạnh hơn prednisolon 7 lần.

- Clindamycin là kháng sinh thuộc nhóm lincosamid. Cơ chế tác dụng của clindamycin là liên kết với tiểu phân 50S của ribosom do đó ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn. Trên invitro, clindamycin có tác dụng với các vi khuẩn sau: cầu khuẩn gram dương ưa khí: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, Streptococci (trừ *S. faecalis*), *Pneumococcus*; cầu khuẩn gram dương kỵ khí: *Peptococcus* và *Peptostreptococcus* spp., *Clostridium perfringens* (trừ *C. sporogenes* và *C. tertium*); trực khuẩn gram dương kỵ khí không sinh nha bào: *Propionibacterium*, *Eubacterium* và *Actinomyces* spp; trực khuẩn gram âm kỵ khí: *Bacteroides* (*B. fragilis*) và *Fusobacterium* spp; các vi khuẩn khác: *Chlamydia trachomatis*, *Toxoplasma gondii*, *Plasmodium falciparum*, *Pneumocystis carinii*, *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma brominn*.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Dexamethason hấp thu tốt ngay vị trí dùng thuốc, phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể, qua nhau thai và một lượng nhỏ qua sữa. Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu. Nửa đời sinh học của dexamethason là 36-54 giờ.

- Clindamycin: phân bố rộng khắp trong các dịch và mô của cơ thể, hơn 90% liên kết với protein huyết tương. Nửa đời từ 2-3 giờ, nhưng có thể kéo dài ở trẻ sơ sinh và những người bị suy thận nặng. 0,7 µg/ml clindamycin được tìm thấy trong nước tiểu sau khi sử dụng 2 lần trong ngày. Sau khi bôi nhiều lần lên da, nồng độ thuốc trong huyết tương rất thấp (0-3 ng/ml) và có ít hơn 0,2% liều sử dụng tìm thấy trong nước tiểu. Tuổi tác không làm thay đổi dược động học của clindamycin, nếu chức năng gan thận bình thường.

CHỈ ĐỊNH

Các bệnh ngoài da đáp ứng với corticoid tại chỗ và có bội nhiễm như: chàm, vết côn trùng cắn, nhiễm khuẩn ngoài da, mụn trứng cá do vi khuẩn đã kháng lại các

kháng sinh khác, viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã nhờn, viêm da dị ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng nguyên phát do siêu vi, nấm và ký sinh trùng.
- Tổn thương có loét.
- Tăng cảm với dexamethason hay clindamycin.
- Trẻ sơ sinh, nhũ nhi.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

- Thoa lớp mỏng 1-2 lần/ ngày.
- Không dùng quá 8 ngày cho một đợt điều trị.

THẬN TRỌNG

- Không nên thoa lớp dày, trên diện rộng, nơi băng kín, mí mắt, vùng vú ở phụ nữ cho con bú.
- Chỉ thoa lên mặt khi có chỉ định của bác sĩ.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai: chỉ sử dụng khi thật cần thiết.

Phụ nữ cho con bú: nên tránh sử dụng trong khi điều trị.

NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI DÙNG BẤT CỨ LOẠI THUỐC NÀO

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Khi lái xe và vận hành máy móc thuốc không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa ghi nhận tương hợp nào.

ĐỂ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ XẢY RA, PHẢI LUÔN LUÔN BẢO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI THUỐC KHÁC ĐANG DÙNG

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Do là thuốc dùng ngoài nên tác dụng không mong muốn ít xảy ra. Nếu có thường là:

- Phản ứng dị ứng: ban đỏ, nổi mề đay.
- Dùng lâu ngày có thể gây giữ natri và nước, teo da, rạn da, rụng lông, teo cơ có hồi phục, loãng xương, loét dạ dày tá tràng, rối loạn kinh nguyệt.
- Khi dùng kéo dài trên diện rộng có thể gây teo tuyến thượng thận, đôi khi gây choáng phản vệ, huyết khối tắc mạch, tăng bạch cầu ưa eosin, viêm đại tràng giả mạc, ã chảy, buồn nôn.

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC NÀY

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

- Sử dụng kéo dài trên diện rộng có thể dẫn đến việc hấp thu thuốc toàn thân.
- Xử trí: cho ngưng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

BẢO QUẢN: nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất theo TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
THUỐC BÁN THEO ĐƠN**