

182/193

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

(SCBS LẦN 1)

I) NHÃN CHAI 100 ml

Lần đầu: 27/12/2013

Tên bệnh nhân:	Rx Thuốc bán theo đơn 100 ml DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN DEXTROSE 10% Độ thẩm thấu: 555 mOsmol/l Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ	297/5 Lý Thường Kiệt St. - Đ. 11 - HCMC-Vietnam Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-Stock Co. Họ/ Bp. Date: Ngày sử dụng: Số lô/ Batch No.: Số/ Serial No.:
Số hồ sơ:		
Ngày:		
Tốc độ truyền:		
Thuốc pha thêm:		
Điều dưỡng thực hiện:	Công thức: Dextrose khan: 10g Nước cất pha tiêm vào đủ: 100ml Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. CHỈ CHÚ: - không được dùng nếu có cặn, có màu, kết tủa hay hư hỏng. - không được để đông lạnh. ĐỌC TỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM - tiêu chuẩn áp dụng: DIN EN 13747 BẢO QUẢN NƠI KHÔ BẢO, TRÁNH ÁNH SÁNG, NHỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C. CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 297/5 Lý Thường Kiệt St. - Đ. 11 - HCMC-Vietnam	DEXTROSE 10% Intrusion 100 ml Rx Prescription only
Theo y lệnh của bác sĩ:		

II) NHÃN CHAI 250 ml

Tên bệnh nhân:	Rx Thuốc bán theo đơn 250 ml DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN DEXTROSE 10% Độ thẩm thấu: 555 mOsmol/l Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ	297/5 Lý Thường Kiệt St. - Đ. 11 - HCMC-Vietnam Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-Stock Co. Họ/ Bp. Date: Ngày sử dụng: Số lô/ Batch No.: Số/ Serial No.:
Số hồ sơ:		
Ngày:		
Tốc độ truyền:		
Thuốc pha thêm:		
Điều dưỡng thực hiện:	Công thức: Dextrose khan: 25g Nước cất pha tiêm vào đủ: 250ml Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. CHỈ CHÚ: - không được dùng nếu có cặn, có màu, kết tủa hay hư hỏng. - không được để đông lạnh. ĐỌC TỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM - tiêu chuẩn áp dụng: DIN EN 13747 BẢO QUẢN NƠI KHÔ BẢO, TRÁNH ÁNH SÁNG, NHỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C. CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 297/5 Lý Thường Kiệt St. - Đ. 11 - HCMC-Vietnam	DEXTROSE 10% Intrusion 250 ml Rx Prescription only
Theo y lệnh của bác sĩ:		

III) NHÃN CHAI 500 ml

Tên bệnh nhân:	Rx Thuốc bán theo đơn 500 ml DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN DEXTROSE 10% Độ thẩm thấu: 555 mOsmol/l Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ	297/5 Lý Thường Kiệt St. - Đ. 11 - HCMC-Vietnam Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-Stock Co. Họ/ Bp. Date: Ngày sử dụng: Số lô/ Batch No.: Số/ Serial No.:
Số hồ sơ:		
Ngày:		
Tốc độ truyền:		
Thuốc pha thêm:		
Điều dưỡng thực hiện:	Công thức: Dextrose khan: 50g Nước cất pha tiêm vào đủ: 500ml Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. CHỈ CHÚ: - không được dùng nếu có cặn, có màu, kết tủa hay hư hỏng. - không được để đông lạnh. ĐỌC TỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM - tiêu chuẩn áp dụng: DIN EN 13747 BẢO QUẢN NƠI KHÔ BẢO, TRÁNH ÁNH SÁNG, NHỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C. CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 297/5 Lý Thường Kiệt St. - Đ. 11 - HCMC-Vietnam	DEXTROSE 10% Intrusion 500 ml Rx Prescription only
Theo y lệnh của bác sĩ:		

III). TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

R_x

DEXTROSE 10%

Dung dịch tiêm truyền

CÔNG THỨC:

TÊN THÀNH PHẦN	HÀM LƯỢNG		
	Chai 100 ml	Chai 250 ml	Chai 500 ml
Dextrose tương đương Dextrose khan	10 g	25 g	50 g
Nước cất pha tiêm vừa đủ	100 ml	250 ml	500 ml

DƯỢC LỰC HỌC:

Dextrose là đường đơn 6 carbon, dùng theo đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch để điều trị thiếu hụt đường và dịch. Dextrose thường được sử dụng để cung cấp năng lượng theo đường tiêm cho người bệnh và dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị mất nước do tiêu chảy cấp. Dextrose còn được sử dụng để điều trị chứng hạ đường huyết.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Dextrose được hấp thu nhanh chóng theo đường tiêm tĩnh mạch.
- Sau khi vào cơ thể, Dextrose chuyển hóa thành carbon dioxide và nước đồng thời giải phóng ra năng lượng.

CHỈ ĐỊNH:

- Cung cấp nước và năng lượng cho cơ thể.
- Giải độc trong trường hợp nhiễm khuẩn cấp và mạn, thuốc ngủ, ngộ độc do Cyanide; sốc, viêm gan hoặc xơ gan.
- Chất dẫn để truyền thuốc vào cơ thể trước, trong và sau phẫu thuật.
- Phòng ngừa và điều trị chứng nhiễm Ceton huyết trong các trường hợp suy dinh dưỡng.
- Dùng cho chứng giảm Dextrose huyết.

CÁCH DÙNG:

- Truyền dung dịch Dextrose 10% qua tĩnh mạch trung tâm. Trong trường hợp cấp cứu hạ đường huyết có khi phải truyền vào tĩnh mạch ngoại vi nhưng cần phải truyền chậm.
- Liều dùng thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người bệnh. Phải theo dõi chặt chẽ đường huyết của người bệnh.
- Liều dextrose tối đa khuyến dùng là 500 – 800 mg cho 1 kg thể trọng trong 1 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bệnh không dung nạp được Dextrose.
- Người bệnh vô niệu, người bệnh bị chảy máu trong sọ hoặc trong tuỷ sống, người bệnh sau cơn tai biến mạch máu não.
- Tình trạng mất nước nhược trương nếu chưa bù đủ chất điện giải.
- Tình trạng ứ nước.
- Kali huyết hạ, hôn mê tăng thâm thẩu, nhiễm toan.
- Mê sảng rượu kèm mất nước, ngộ độc rượu cấp.

THẬN TRỌNG:

- Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng nước và các chất điện giải. Cần bổ sung các chất điện giải nếu cần.
- Không truyền dung dịch Dextrose cùng với máu qua một bộ dây truyền vì có thể gây tan huyết hoặc tắc nghẽn.
- Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn dung dịch Dextrose 10% có thể gây mất nước tế bào do tăng đường huyết.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY:

Chưa thấy dung dịch tiêm truyền Dextrose 10% ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy sau khi tiêm truyền.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

- Phụ nữ có thai chỉ dùng Dextrose 10% khi thật cần thiết.
- Dextrose 10% an toàn cho phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Thường gặp: đau tại chỗ tiêm, kích ứng tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch.
 - Ít gặp: rối loạn nước và điện giải (hạ kali huyết, hạ magesi huyết, hạ phospho huyết).
 - Hiếm gặp: mất nước do hậu quả của đường huyết cao (khi truyền kéo dài hoặc quá nhanh).
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Khi truyền kéo dài hoặc truyền nhanh một lượng lớn Dextrose 10% có thể gây mất nước tế bào do tăng đường huyết.
- Xử trí quá liều:
 - + Giảm liều và/hoặc tiêm insulin nếu đường huyết tăng cao hoặc có đường niệu.
 - + Điều chỉnh thể tích dịch truyền và tốc độ truyền.
 - + Điều chỉnh cân bằng nước và chất điện giải.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.

TRÌNH BÀY:

- Chai 100 ml.
- Chai 250 ml.
- Chai 500 ml.

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐCVN IV

Để xa tầm tay trẻ em

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sỹ.**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Q11 – TP. Hồ Chí Minh



Ngày 06 tháng 06 năm 2013

Giám Đốc Chất Lượng Cơ Sở Đăng Ký & Sản Xuất Thuốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



DS. Nguyễn Thùy Vân