

Dynamogen®

Dung dịch uống.

Thành phần: Mỗi ống 10ml, có chứa:
Glycero® (Cycloheptadine α-ketoglutarate) 3mg.
Arginine aspartate 1g.
Tùi duong: Saccharose (3,573g), dung dịch sorbitol 70% (4,873g), nước, dung dịch chất hooc-phat.

Dược lý học:

Dynamogen là một sản phẩm của sự kết hợp giữa hai hoạt chất bao gồm: Glycero® (do chính FAES FARMA, S.A. nghiên cứu và sản xuất) và Arginine Aspartate để tạo nên một hiệu quả tác dụng ngăn ngừa suy nhược. Thuốc có thể dùng điều trị suy nhược và bồi bổ cơ thể.

Chỉ định:

Trong các quá trình cần thiết để khôi phục lại sự cung cấp các yếu tố cơ bản làm hoạt hóa năng lượng của cơ thể. Điều trị suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, bệnh nhân đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.

Sự tương tác với các thuốc khác và thức ăn:

Không nên sử dụng đồng thời với thuốc ức chế MAO. Nếu tránh dùng cùng với thuốc kháng Choline, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, hạ vòng, tác dụng kháng Choline tăng cường có thể xảy ra.

Không nên dùng kết hợp Dynamogen với các thuốc ngủ và thuốc an thần vì thuốc có thể làm tăng tác dụng gây buồn ngủ.

Chống chỉ định:

Nhạy cảm với cycloheptadine.

Vì trong thành phần của thuốc có chứa Cycloheptadine oketoglutarate, không được dùng cho phụ nữ đang cho con bú, trẻ dưới hoặc trẻ mới sinh.

Mặc dù không có chứng chỉ định, nhưng không nên dùng cho những bệnh nhân bị suy thận hoặc suy gan nặng.

Thận trọng:

Cần thận trọng khi sử dụng cho những bệnh nhân có tuổi, hoặc những bệnh nhân có triệu chứng phì đại tiền liệt tuyến và những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi tăng nhãn áp góc họng.

Không nên dùng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Không nên dùng cho người đang vận hành máy móc, thu, lái...

Sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú:

Cần thận trọng, không nên dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.

Tính tương tự:

Giảm cảm lực.

Tác dụng phụ:

Cycloheptadine oketoglutarate có thể gây buồn ngủ nhẹ, trong trường hợp sử dụng lạm dụng có thể tạo ra động tháo trong vài ngày. Cần ghi chú cẩn thận nếu lái xe hoặc vận hành máy móc.

Cảnh báo:

Đo những đặc điểm: trọng lý (tình trạng buồn ngủ). Dynamogen có thể làm giảm khả năng lái xe hoặc vận hành những máy móc nguy hiểm.

Những cảnh báo liên quan đến các thành phần khác:

Thuốc có chứa 3,573g Saccharose trong mỗi ống 10ml, cần phải cẩn thận khi sử dụng cho những bệnh nhân bị không dung nạp fructose di truyền, có vấn đề về hấp thu Glucosa/galactose. Thiếu hụt saccharase-isomaltase, và tiêu đường. Mỗi ống thuốc có chứa 4,873g dung dịch sorbitol 70% nên có thể gây táo và loạn tiêu hóa.

Thuốc có chứa 1g Arginine aspartate nên nó có thể là nguyên nhân gây táo tiêu trong một số trường hợp.

Lưu ý:

Trẻ em: 1 ống x 2 lần mỗi ngày, tối nhất nên uống mía giờ trước bữa ăn chính.

Người lớn: Có thể dùng 3 ống/ngày.

Điều trị trong những trường hợp bị ngộ độc hay quá liều:

Uống với lượng lớn, đặc biệt ở trẻ em có thể gây trầm cảm hoặc kích thích/bị thần kinh trung ương, thậm chí co giật.

Chỉ dẫn khẩn cần tuân theo:

Kích thích són sau khi uống một cốc nước. Nếu không thể són, có thể tiến hành rửa dạ dày với dung dịch nước muối sinh lý. Những thuốc tây nhẹ cũng có thể được sử dụng (soda Magie carbonate...). Trong trường hợp bị hạ huyết áp, cần sử dụng một số thuốc làm tăng huyết áp. Dưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Trình bày:

Hộp 20 ống, mỗi ống 10 ml.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Tách riêng từng ống.
2. Bé xoắn tại trên của ống.
3. Độc đầu trên xuống vào cốc và ăn để đổ thuốc vào cốc.

Bảo quản: Nơi mát dưới 25°C.

Để xa tầm với của trẻ:

Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hạn dùng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:

FAES FARMA, S.A.

Máximo Aguirre, 14-48940 Lamiaco (Lejona) Vizcaya
Spain (Tây Ban Nha).

Tác dụng phụ: