



DUY TRÌ HỆ MIỄN DỊCH KHỎE MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

THÀNH PHẦN

Mỗi mL sirô (uống dạng giọt) chứa:

Kẽm nguyên tố..... 10 mg
(dưới dạng kẽm sulfate monohydrate 27,5 mg)

Mỗi 5 mL (1 muỗng cà phê) sirô chứa:

Kẽm nguyên tố..... 20 mg
(dưới dạng kẽm sulfate monohydrate 55 mg)

Tá dược: Đường nghịch chuyển, Sorbitol Solution, Glycerin, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Sodium Citrate Hydrate, Sodium Chloride, Acesulfame Potassium, DC Yellow #10 88-94%, Hương Táo FU29289, Mint Cool 79770-36, Nước tinh khiết.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sirô **E-Zinc™** có màu vàng, hương vị táo tươi, chua ngọt, hơi đặc và hơi mờ đục.

ĐƯỢC LÝ

Những chức năng chính yếu của kẽm:

- Cần thiết cho sự phát triển bình thường và duy trì hệ miễn dịch khoẻ mạnh, giúp điều hòa hoạt động của các tế bào tham gia vào chức năng miễn dịch.
 - Có tác động chống oxy hóa nhờ vai trò là 1 đồng yếu tố của enzyme superoxide dismutase, enzyme này tham gia vào việc loại bỏ các gốc tự do có hại.
 - Là đồng yếu tố của nhiều enzyme tham gia vào sự phân chia và phát triển tế bào.
- Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và UNICEF cũng khuyến cáo dùng kẽm trong điều trị hỗ trợ tiêu chảy cấp cùng với dung dịch bù nước và điện giải có nồng độ thẩm thấu thấp (ORS).

CHỈ ĐỊNH

Dùng **E-Zinc™** trong các trường hợp sau:

- Điều trị hỗ trợ tiêu chảy cấp.
- Nhiễm trùng tái diễn ở đường hô hấp, da.
- Giúp hỗ trợ tăng trưởng và phát triển thể chất.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Liều lượng trong điều trị hỗ trợ tiêu chảy cấp cùng với ORS có nồng độ thẩm thấu thấp		
Nhóm tuổi	Uống 1 lần / ngày trong thời gian tiêu chảy. Dùng trong 10-14 ngày ngay cả khi đã hết tiêu chảy.	
	Sirô (uống dạng giọt)	Sirô
Dưới 6 tháng	1 mL	2,5 mL hoặc 1/2 muỗng cà phê
Từ 6 tháng trở lên	2 mL	5 mL hoặc 1 muỗng cà phê
Hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.		

Liều lượng trong bổ sung dinh dưỡng		
Nhóm tuổi	Uống 1 lần / ngày	
	Sirô (uống dạng giọt)	Sirô
6-11 tháng	0,5 mL	
1-3 tuổi	0,5 mL	1,25 mL (1/4 muỗng cà phê)
4-8 tuổi		2,5 mL (1/2 muỗng cà phê)
9-13 tuổi		2,5-5 mL (1/2-1 muỗng cà phê)
Người lớn		2,5-5 mL (1/2-1 muỗng cà phê)
Hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.		

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong công thức.

THẬN TRỌNG

Nếu bệnh nhân quên một liều dùng, chỉ cần dùng liều kế tiếp và các liều tiếp theo như trong liều dùng đã khuyến cáo, tức là một lần mỗi ngày.
Không dùng gấp đôi liều đề nghị trừ khi được bác sĩ khuyên dùng.
Nếu bệnh nhân đã dùng nhiều hơn liều đề nghị, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

TÁC DỤNG PHỤ

Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa như buồn nôn và nôn được thấy khi dùng liều trên 30 mg kẽm nguyên tố.
Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Ngộ độc kẽm cấp tính hiếm khi xảy ra. Các dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng liều cao kẽm (4-8 gam) bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, có vị kim loại trong miệng và ngủ lịm.
Trong trường hợp quá liều, nên cho dùng các chất làm dịu như sữa; các chất tạo chelat như sodium edetate có thể có ích.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không ghi nhận sự tương tác giữa thức ăn hoặc các thuốc khác với lượng kẽm có trong **E-Zinc™**.

TRÌNH BÀY

Sirô (uống dạng giọt) **E-Zinc™** - Hộp 1 chai 15 mL.

Sirô **E-Zinc™** - Hộp 1 chai 60 mL.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc này sau 30 ngày kể từ khi mở nắp.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
WHO-GMP, GLP, GSP
Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II,
Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 08-39621000
Nhượng quyền của: United Laboratories, Inc