



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp (hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng)

Nhãn vỉ FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp (vỉ 10 viên nang cứng)

Số lô SX, HD in nổi trên vỉ



CÔNG THỨC:

Bột mịn Mã tiền chế ứng tương đương 0,7mg Strychnin
(*Powderum Semen Strychni praeparatum*)

Cao Hy thiêm.....88mg

Tương ứng với Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*) 852mg

Cao Ngũ gia bì chân chim.....18mg

Tương ứng với Ngũ gia bì chân chim 232mg
(*Cortex Schefflerae heptaphyllae*)

Cao Tam thất.....10mg

Tương ứng với Tam thất 50mg
(*Radix Panaxis notoginseng*)Tá dược.....vừa đủ 1 viên
(tinh bột ngô, lactose, magnesi stearat, vỏ nang cứng)

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các chứng đau dây
thần kinh liên sườn, đau vai, gáy, đau
các chi, đau lưng, đau nhức các khớp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống mỗi lần 2 viên ngày
2 lần. Uống sau khi ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG,

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SBK:

KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.





MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp **FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp (hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)**

CÔNG THỨC:

Bột mịn Mã tiền chế..... lượng tương đương 0,7mg Strychnin
(*Powderum Semen Strychni praeparatum*)
Cao Hy thiêm.....88mg
Tương ứng với Hy thiêm (*Herba Stigoesbeckiae*) 852mg
Cao Ngũ gia bì chân chim.....18mg
Tương ứng với Ngũ gia bì chân chim 232mg
(*Cortex Schottleriae heptaphyllae*)
Cao Tam thất.....10mg
Tương ứng với Tam thất (*Radix Panaxis notoginseng*) 50mg
Té được.....vừa đủ 1 viên
(tinh bột ngô, lactose, magnesi stearat, vỏ nang cứng)

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các chứng đau dây thần kinh
liên sườn, đau vai, gáy, đau các chi,
đau lưng, đau nhức các khớp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống mỗi lần 2 viên, ngày
2 lần. Uống sau khi ăn.



HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

风湿
胶囊

FENGSHI
OPC
VIÊN
PHONG THẤP



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM, ĐT: 08.37517111

GMP-WHO

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG
MONG MUỐN:** Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS. SĐK:

KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Ngày SX:
HĐ:

GMP-WHO

Sản xuất tại: CHI NHANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC TẠI BÌNH CƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
áp Tân Hòa Xã Tân Vĩnh Hiệp, Phường Tân Thuận, Bình Dương

FENGSHI
OPC
VIÊN
PHONG THẤP

HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

风湿
胶囊

FENGSHI-OPC
VIÊN PHONG THẤP





MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp

CÔNG THỨC: cho 1 viên

Bột mịn Mã tiền chế (*Powderum Semen Strychni praeparatum*) lượng tương đương 0,7mg Strychnin
Cao Hy thiêm 88 mg
Tương ứng với Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*) 852 mg
Cao Ngũ gia bì chân chim 18 mg
Tương ứng với Ngũ gia bì chân chim (*Cortex Schefflerae heptaphyllae*) 232 mg
Cao Tam thất 10 mg
Tương ứng với Tam thất (*Radix Panaxis notoginseng*) 50 mg
Tá dược (Tinh bột Ngô, Lactose, Magnesi stearat, Vỏ nang cứng) vd 1 viên

LÂM SÀNG:

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp có tác dụng giảm đau, tê, chống viêm, dẫn cơ, giảm giới hạn vận động khớp trên bệnh nhân thấp ngoài khớp, đau thấp nhiều cơ.

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp thích hợp cho người thể hàn, đối với người thể nhiệt khi sử dụng thuốc nên dùng thêm thức ăn, uống mát.

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp không có tác dụng phụ gây hại, không độc khi dùng ở liều điều trị.

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp làm thay đổi trị số VS theo chiều hướng giảm, nhưng không làm thay đổi các trị số cận lâm sàng: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, acid uric, không ảnh hưởng lên chức năng gan thận sau 12 ngày điều trị.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các chứng đau dây thần kinh liên sườn, đau vai, gáy, đau các chi, đau lưng, đau nhức các khớp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần. Uống sau khi ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, bệnh nhân suy gan, suy thận.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Không dùng quá liều chỉ định.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không được sử dụng.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Nhức đầu, khát nước, cồn cào dạ dày, táo bón, nóng bừng mặt, buồn ngủ. Các triệu chứng trên chiếm tỷ lệ thấp, tự hết, không ảnh hưởng đến sinh hoạt làm việc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Áp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh