

MẪU HỘP 6 VỈ XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực : 10,5 cm x 4,5 cm x 4,2 cm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 24/3/2012

Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim

Fumygiko

Ginkgo biloba 80mg

Điều trị suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi



GMP - WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - F.T. PHARMA
10 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Công thức:

- Cao bạch quả 80 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên bao phim

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người có rối loạn đông máu. Đang xuất huyết.

Chỉ định:

Các triệu chứng suy giảm trí năng của người lớn tuổi (các rối loạn về chú ý, trí nhớ...). Điều trị triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắc động mạch chi dưới mẫn tính (giai đoạn II). Cải thiện hội chứng Raynaud. Được đề nghị trong vài hội chứng có thể do nguyên nhân thiếu máu cục bộ như: chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, suy võng mạc.

Bảo quản: Ở nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim

Fumygiko

Ginkgo biloba 80mg

Điều trị suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi



GMP - WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - F.T. PHARMA
10 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Liều dùng và cách sử dụng:

Liều thông thường: 2 - 3 viên/ngày, chia làm 2 - 3 lần, uống trong bữa ăn.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO số 930C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM

SDK :

Tiêu chuẩn : TCCS

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Ngày 06 tháng 01 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



MẪU VỈ XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực : 10,0 cm x 4,0 cm



Ngày 06 tháng 01 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sĩ*

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực : 9,2 cm x 18,0 cm

Fumygiko

Viên bao phim

CÔNG THỨC : Công thức cho 1 viên bao phim

- Cao bạch quả.....80 mg
- Tá dược: Microcrystalline cellulose 101 (Avicel 101), Lactose monohydrat, Magnesi stearat, Bột Talc, Aerosil 200, Natri starch glycolat, Nipagin, Tinh bột ngô, Pharmacoat 615, Polyethylenglycol 6000, Polysorbat 80, Titan dioxyd, Oxyd sắt đỏ, Oxyd sắt vàng, Nước tinh khiết, Ethanol 96%.

CHỈ ĐỊNH:

Các triệu chứng suy giảm trí năng của người lớn tuổi (các rối loạn về chú ý, trí nhớ...).

Điều trị triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắc động mạch chi dưới mãn tính (giai đoạn II). Cải thiện hội chứng Raynaud. Được đề nghị trong vài hội chứng có thể do nguyên nhân thiếu máu cục bộ như: chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, suy võng mạc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 12 tuổi.

Người có rối loạn động máu. Đang xuất huyết.

Phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG :

Thuốc này không phải là thuốc hạ áp và không thể thay thế việc điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu.

TƯƠNG TÁC THUỐC :

- Sự tương tác được biết đến và đáng kể nhất là giữa Ginkgo và thuốc chống đông máu warfarin, vì hoạt tính của ginkgo gồm cả ngăn chặn yếu tố kích hoạt tiểu cầu. Bởi vậy nếu dùng ginkgo với warfarin, hay những chất chống tiểu cầu, làm loãng máu khác như aspirin, dipyridamol, ticlopidine, heparin thì cần phải theo dõi kỹ lưỡng.

- Liều cao Ginkgo có thể làm giảm hiệu nghiệm của thuốc trị động kinh như valproic acid hay carbamazepine.

- Ginkgo có thể cũng có lợi ích khi dùng chung với cyclosporine vì đặc tính bảo vệ màng mô.

- Ginkgo có thể có hiệu nghiệm giúp trị rối loạn tình dục khi dùng chung với papaverine khi chất này không cho hiệu quả mong muốn khi dùng một mình.

- Một trường hợp tương trình cho hay có thể có tương tác với thuốc lợi tiểu thiazide làm áp huyết bệnh nhân tăng, và sau đó trở lại bình thường khi ngưng cả hai thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Phụ nữ có thai: Chưa có trường hợp nào gây quái thai do dùng thuốc được ghi nhận.

- Phụ nữ cho con bú: Được sử dụng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Thường nhẹ gồm buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, hồi hộp, bứt rứt, suy nhược, và ngứa ngoài da. Thông báo ngay cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Chưa có tài liệu nghiên cứu.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG :

Liều thông thường: 2-3 viên/ngày chia làm 2-3 lần, uống trong bữa ăn.

QUY CÁCH ĐÓNG GỐI: Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim; Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Viên bao phim FUMYGIKO đạt theo TCCS

- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: ft-pharma@hcm.vnn.vn Website: www.ft-pharma.com.vn



Ngày 06 tháng 01 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ