

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 28/12/2018

GINKOHOMMAX GINKOHOMMAX GINKOHOMMAX

GINKOHOMMAX GMP - WHO
HATAPHAR
SDK (Reg No.):
SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg

GINKOHOMMAX GMP - WHO
HATAPHAR
SDK (Reg No.):
SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg

GINKOHOMMAX GMP - WHO
HATAPHAR
SDK (Reg No.):
SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg

GINKOHOMMAX GMP - WHO
HATAPHAR
SDK (Reg No.):
SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg

GINKOHOMMAX GMP - WHO
HATAPHAR
SDK (Reg No.):
SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg

GINKOHOMMAX GMP - WHO
HATAPHAR
SDK (Reg No.):
SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg

GINKOHOMMAX GINKOHOMMAX GINKOHOMMAX



GINKOHOMMAX

Cao bạch quả 40 mg

GMP - WHO

GINKOHOMMAX

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

CAO BẠCH QUẢ



HATAPHAR

GINKOHOMMAX

Powdered Ginkgo extract USP 32 40mg

GINKOHOMMAX

Powdered Ginkgo extract USP 32 40mg

GINKOHOMMAX

Powdered Ginkgo extract USP 32 40mg

GINKOHOMMAX

Box of 3 blisters x 10 softgels

Thành phần/Composition:

Mỗi viên nang mềm chứa/ Each softgel contains:
Cao bạch quả (powdered Ginkgo extract USP 32) 40 mg
Tá dược vđ/ Excipients q. s.f 1 viên/ 1 softgel

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng
/Indications, Contraindications, Dosage -
Administration: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc bên trong hộp/ See the package insert
inside.

Bảo quản/ Storage:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/
Store in a dry place, below 30°C.

Tiêu chuẩn/Specification:
TCCS/Manufacturer's.

**Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng trước khi dùng.**

Keep out of reach of children.

Carefully read the accompanying
instructions before use.

Sản xuất tại/ Manufactured by:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/
HATAY PHARMACEUTICAL JSC
La Khê-Hà Đông-TP. Hà Nội/ La Khe-Ha Dong-Ha Noi City

SDK (Reg No.):

Số lô SX (lot. No):

Ngày SX (Mfg. Date):

HD (Exp. Date):

KT: (130 x 82 x 35) mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc GINKOHOMMAX

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao bạch quả (Powdered Ginkgo extract USP32) 40mg
(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, lecithin, sáp ong trắng, dầu cọ, aerosil, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, nipagin, nipasol, ethyl vanilin, titan dioxyd, gôm arabic, phẩm màu Chocolate, ethanol 90°, nước tinh khiết.)
- **Chỉ định:** Thuốc được dùng trong các trường hợp:
 - * Giảm trí nhớ, kém tập trung tư tưởng, đặc biệt ở người cao tuổi để chống stress. Phòng và điều trị tai biến mạch máu não.
 - * Các triệu chứng đau do suy tuần hoàn ở động mạch ngoại vi.
 - * Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thị lực và chứng suy võng mạc mắt do thiếu máu cục bộ.
 - * Thuốc còn dùng trong chứng đau cách hồi do tắc động mạch chi dưới mạn tính, hội chứng Raynaud.
- **Cách dùng và liều dùng:** Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1-2 viên x 2-3 lần/ngày. Uống vào trước các bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
- **Chống chỉ định:**
 - Người bị quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
 - Trẻ em dưới 12 tuổi. Giai đoạn cấp của tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp, hạ huyết áp.
 - Phụ nữ có thai.
 - Người đang có xuất huyết hoặc rối loạn đông máu, có nguy cơ chảy máu.
- **Thận trọng:** Thuốc không phải là thuốc chống cao huyết áp vỡ vỡ khụng thể thay thế cho còc thuốc cao huyết áp đặc hiệu được, trậ trọng sử dụng thuốc cho phụ nữ.
- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ không ảnh hưởng đến hoạt động của người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Nhẹ và hiếm gặp có thể gây rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, chóng mặt, dị ứng da, hạ huyết áp, đánh trống ngực, có thể gây rối loạn chảy máu.
- **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc "
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Không nên dùng đồng thời với thuốc chống đông máu hoặc aspirin. Thuốc hấp thu tốt ở phần trên đường tiêu hoá, dùng thuốc vào bữa ăn đảm bảo hấp thu thuốc nhanh và hoàn toàn vì thuốc lưu lại lâu ở đường tiêu hoá.
- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
- **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lô Khe - Hà Đông - TP. Hà Nội
ĐT: 04.33522203 - 33516101
CƠ PHÂN: 04.33522203
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổng giám đốc

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai