

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

GINKGO SOFT®

GINKGO SOFT®

Ginkgo Biloba Extract 40mg

CÔNG THỨC: (Mỗi viên nang mềm chứa)
Cao bạch quả.....40mg
Tương đương với 200mg Bạch quả (*Folium Ginkgo*)

CHỈ ĐỊNH

Thiếu năng tuần hoàn não: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực.

Suy giảm trí nhớ, mất tập trung, tư duy u ám chậm chạp ở người cao tuổi.

Chấn di khớp gối cách hồi, tê lạnh đầu chi, thiếu máu vùng mạc cực bộ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCGS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC VYTTH HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng - TP. Hải Dương - Hải Dương

Số SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg Date):
HĐ (Exp Date):

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

GINKGO SOFT®

Ginkgo Biloba Extract 40mg



THiếu NăNG Tuần Hoàn Não



2- Nhãn vỉ:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/2014



GINKGO SOFT

Ginkgo Biloba Extract 40mg

COMPOSITION: (Each soft capsule contains)
Ginkgo Biloba Extract.....40mg

INDICATION

Brain circulation insufficiency: Headache, dizziness, vertigo, tinnitus, amblyacusia.

Hypomnesia, aprosexia, retardation of thought in the older persons.

Intermittent claudication, limb numbness, retina ischaemia.

CONTRAINDICATION, DOSAGE, ADMINISTRATION, INTERACTION, SIDE EFFECT: Please read carefully the accompanying instructions insert inside.

STORAGE: Store in a cool-dry place, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USED

REG NO:

Manufactured by:
Hải Dương Pharmaceutical Medical Material., Jsc
102 Chi Lăng - Hải Dương City - Hải Dương Pro
According to the contract with:

BOX OF 10 BLISTERS OF 10 CAPSULES

GINKGO SOFT®

Ginkgo Biloba Extract 40mg




BRAIN CIRCULATION INSUFFICIENCY



308/15

2- Nhận ví:



Ginkgo Biloba Extract 40mg

CÔNG THỨC: (Mỗi viên nang chứa)

Cao bạch quả..... 40mg
Tương đương với 200mg Bạch quả (Folium Ginkgo))

CHỈ ĐỊNH

Thiếu năng tuần hoàn não: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực.

Suy giảm trí nhớ, mất tập trung, tư duy u ám chậm chạp ở người cao tuổi.

Chẩn di khắp khắp cách hỏi, te lạnh đầu chi, thiếu máu vòng mac cực bộ.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẒ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VNTT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - TP. Hải Dương - Hải Dương

Số lô SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

GINKO SOFT®

Ginkgo Biloba Extract 40mg

THIẾT NANG TUẦN HOÀN NẤO

Giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, thanh lọc kém



GINKO SOFT®

Ginkgo Biloba Extract 40mg

COMPOSITION: (Each soft capsule contains)

Ginkgo Biloba

INDICATION
Brain circulation insufficiency: Headache, dizziness, vertigo, tinnitus, amblyacousia.

Hypomnesia, aprosexia, retardation of thought in the older persons.

Intermittent claudication, limb numbness, retinal ischaemia.

CONTRAINDICATION, DOSAGE, ADMINISTRATION, INTERACTION, SIDE EFFECT: Please read carefully.

STORAGE: Store in a cool, dry place, protect from the accompanying instructions insert inside.

SPECIFICATION: Mounts in a cool-dry place, protect from light.

**SPECIFICATION: MANUFACTURER'S
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY
READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS**

READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USED

REG NO:

*Manufactured by:
Hai Duong Pharmaceutical Medical Material., Jsc
102 Chi Lang - Hai Duong City - Hai Duong Prov
According to the contract with:*

BOX OF 6 BLISTERS OF 10 CAPSULES

GINKO SOFT®

Ginkgo Biloba Extract 40mg

GNIP
WHO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GINKOSOF

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô Bạch quả

40mg

(tương đương với 2000mg Bạch quả (*Folium Ginkgo*))

Tá dược: (Dầu nành, dầu cọ, sáp ong, lecithin, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, màu green S.....vđ 1 viên.).

Chỉ định

- Thiếu năng tuần hoàn não: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực.
- Suy giảm trí nhớ, mất tập trung, tư duy u ám ở người cao tuổi..
- Chân đi khắp khiễng cách hồi, tê lạnh đầu chi, thiếu máu võng mạc cục bộ.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không dùng cho nhồi máu pha cấp

Thận trọng

- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.
- Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng đồng thời với các vị thuốc có tác dụng chi huyết.

Liều dùng - cách dùng

- Người lớn : Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.
 - Trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2-3 lần
- Dùng theo đường uống, nuốt cả viên không nhai, sau bữa ăn.

Thời gian sử dụng từ 4-12 tuần. Riêng với các bệnh nhân chân đi khắp khiễng cách hồi, tê lạnh đầu chi thời gian sử dụng kéo dài tới 24 tuần.

Tác dụng không mong muốn

Thường nhẹ và hiếm gặp như: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da, có thể kéo dài thời gian đông máu. Các hiện tượng này sẽ mất đi khi dùng uống thuốc.

"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác thuốc:

Chưa có báo cáo.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú..

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc dùng được cho người lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo sử dụng thuốc quá liều.

Không dùng quá liều chỉ định ..

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Vi 10 viên; Hộp 6 vi, 10 vi kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - Không dùng quá liều chỉ định.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng-Phường Nguyễn Trãi- TP Hải Dương-tỉnh Hải Dương

ĐT/ Fax : 03203.853.848