



Hoàn cứng SITAR

Theo y học cổ truyền, Khí trong cơ thể con người được coi là một trong 3 báu vật (Tam bảo): TINH – KHÍ – THẦN. Khí là năng lượng sinh học (Bio – energy), là động lực để các bộ phận trong cơ thể hoạt động được, nếu khí hư (thiếu năng lượng) thì mọi hoạt động bất cập. Khí của tạng tỳ được gọi là Tỳ Khí thuộc Trung khí, bình thường có xu hướng đi lên trên, nếu hư yếu không thăng tán được thậm chí hãm xuống sẽ gây ra:


- Các chứng sa giáng: trĩ nội, trĩ ngoại, sa dạ dày, sa tử cung, rong kinh kéo dài.
- Chán ăn, ăn ít, rối loạn tiêu hóa, đầy trướng bụng, tiêu chảy mạn tính; chân tay yếu, mỏi, ngại hoạt động.

Hoàn SITAR – có xuất xứ từ bài thuốc cổ phương, được phối hợp từ 10 vị thuốc có tác dụng Bổ Tỳ, Kiện Vị, Bổ Trung Khí, Thăng Dương khí, nhờ đó giúp cơ thể điều chỉnh, khắc phục được các bệnh nói trên.

Với 100% nguyên liệu thiên nhiên, hoàn cứng SITAR được công ty cổ phần TRPHACO sản xuất theo nguyên lý Y học cổ truyền, kết hợp công nghệ hiện đại nhằm phát huy tối đa hiệu lực phương thuốc quý.

TRÌNH BÀY: Hộp 10 gói, 20 gói x 5g hoàn cứng

THÀNH PHẦN: cho 1 gói 5 g chứa:

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)		0,4g
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)		1,4g
Đương qui (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)		0,4g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)		0,4g
Thăng ma (<i>Rhizoma Cimicifugae</i>)		0,4g
Sâm hồ (<i>Radix Bupleuri</i>)		0,4g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)		0,4g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)		0,7g
Sinh khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)		0,14g
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi jujubae</i>)		0,28g
Tá dược (<i>Đường trắng, Parafin rắn, Than hoạt, Mật ong, Acid benzoic, Bột Talc, Nipagin, Nipasol, Tinh bột sắn</i>)		5 g

TÁC DỤNG: Bổ trung ích khí, thăng dương.

CHỈ ĐỊNH:

- Trĩ nội, trĩ ngoại, sa dạ dày, sa tử cung.
- Chán ăn, ăn ít, bụng trướng, ỉa chảy lâu ngày.
- Chân tay mỏi mệt, ngại hoạt động.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

- Uống 1-2 gói 5 g/ lần x 3 lần/ ngày. Uống với nước ấm.
- Mỗi đợt dùng 1 – 2 tháng.

CHUNG CHỈ ĐỊNH:

Chỉ định dùng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Người tăng huyết áp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc gây nên.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Phụ nữ có thai.
- Không nên dùng thuốc trong các trường hợp sau: nhiệt lỵ mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, nôn ra máu, thở máu cam, có hiện tượng khí nghịch lên.
- Không ăn thức ăn sống lạnh trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác thuốc nào khác được ghi nhận

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai. Sử dụng được cho phụ nữ cho con bú

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Hiện tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NÊN CÂN THÈM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC