

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012

259/0137


TRUNG TÂM THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO

VIÊN NANG
Lubrex
Extra

6 vỉ x 10 viên


VIÊN NANG
Lubrex
Extra



6 vỉ x 10 viên

Traphaco

WHO GMP
CAPSULE
Lubrex
Extra



6 blisters x 10 capsules

Traphaco

CAPSULE
Lubrex
Extra

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Dùng với Glucosamin.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú,
trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi
do chưa có số liệu về độ an toàn và
hiệu quả điều trị.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ
không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

73 Văn Niệm - Bồ Đề - Hà Nội

Tel: (84.4) 3841024 / Fax: (84.4) 3841542

Trụ sở: 10 Nguyễn Văn Ngọc - Hà Nội

Số 10 Nguyễn Văn Ngọc - Hà Nội

- Hồng Lĩnh - Hoàng Mai - Hà Nội

CAPSULE
Lubrex
Extra

6 blisters x 10 capsules

KT hộp: 56mmx66mmx116mm



KT vỉ: 106mmx61mm. Số lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ



Toa hướng dẫn sử dụng

VIÊN NANG LUBREX extra

TRÌNH BÀY: Hộp 6 vỉ x 10 viên

CÔNG THỨC: Cho 1 viên

Glucosamin sulfat kali chlorid	250 mg
Natri chondroitin sulfat	50 mg
Tá dược (Tinh bột, Talc, Aerosil, Magnesi stearat)	vd 1 viên

ĐƯỢC LÝ:

Glucosamin tham gia quá trình chuyển hoá tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một Amino - monosaccharid, nguyên liệu để tổng hợp Proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc Proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là Muco-polysaccharid, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamin đồng thời ức chế các enzym phá huỷ sụn khớp như Collagenase, Phospholipase A₂ và giảm các gốc tự do Superoxid phá huỷ các tế bào sinh sụn. Glucosamin còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất Calci của xương.

Do Glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp, vì thế không những giảm triệu chứng của thoái hoá khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hoá khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Chondroitin là một Glycosaminoglycan (GAG) tham gia vào cấu trúc màng tế bào, có trong thành phần của sợi chun các mạch máu lớn, chiếm tỷ lệ lớn trong chất căn bản của mô sụn và xương, đảm bảo cho sụn xương không những có độ chắc mà còn có tính đàn hồi, là nguyên liệu quan trọng trong quá trình tái tạo mô sụn, xương. Có tác động ngăn ngừa sự thoái hóa tế bào. Duy trì tính đàn hồi của các cấu trúc có nhiều sợi chun (gân, cân cơ, dây chằng). Ngoài ra Chondroitin còn tham gia các cấu trúc trong suốt và đàn hồi của mắt, duy trì các hoạt động sinh lý của mắt.

Trong thoái hóa khớp: Chondroitin ức chế Elastase, yếu tố trung gian trong quá trình thoái hóa mô sụn, đồng thời kích hoạt quá trình tổng hợp Proteoglycan (cấu trúc căn bản của mô liên kết) bởi các tế bào sụn khớp.

LUBREX Extra là thuốc tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái hóa xương khớp cả cấp và mãn tính, có đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp.

CHỈ ĐỊNH:

- Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Thuốc được uống 15 phút trước bữa ăn.

Liều dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 3 viên/lần x 3 lần/ngày

Thời gian sử dụng: 2 – 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh. Có thể nhắc lại 2-3 lần trong 1 năm. Thuốc không gây rối loạn dạ dày ruột nên có thể điều trị lâu dài. Điều trị nên nhắc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh.

- Lubrex Extra là thuốc điều trị nguyên nhân nên thuốc có thể tác dụng sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc chống viêm giảm đau trong những ngày đầu



Traphaco

Hồ sơ đăng ký Lubrex extra

[Handwritten signature]

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Di ứng với Glucosamin

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Hiếm gặp, nhìn chung rất nhẹ, thoáng qua.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG: Không có

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc khác được ghi nhận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

[Handwritten signature]