

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: *20/11/2012*

ML



Công thức: Dịch chiết lá xoài 0,2% : 15 ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03 g, Camphor 0,12 g, Menthol 0,06 g, Natri benzoat 0,18 g, Ethanol 98% 1,8 ml, Nước cất vừa đủ 30 ml.

Chỉ định: - Sát trùng ngoài da trong một số tổn thương da như: chàm, vẩy nến, nấm da, thủy đậu, rôm sảy, giời leo.

Liều lượng và cách dùng:
 + Có thể xịt trực tiếp vào vết thương 2 lần trong ngày.
 + Pha loãng theo tỉ lệ 1:4 để rửa vết thương * 1 ml pha loãng với nước thành 4 ml dung dịch để rửa*.

Chống chỉ định: Bỏng, vết thương hở, người dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.
 Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất theo: TCCS - SDK:

MANGINO VIM
30ml

Dung dịch dùng ngoài

MATURE VIỆT NAM PHARMA, JSC
 No 19 Street Ho St, Linh Chiem Ward
 Thu Duc District, Ho Chi Minh City
 TEL: 09-62-823-556 - FAX: 09-62-823-557

MANGINO VIM
30ml

Dung dịch dùng ngoài

MATURE VIỆT NAM PHARMA, JSC
 No 19 Street Ho St, Linh Chiem Ward
 Thu Duc District, Ho Chi Minh City
 TEL: 09-62-823-556 - FAX: 09-62-823-557

Formula: Extract from mango leafs 0,2% : 15ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03g, Camphor 0,12g, Menthol 0,06g, Natri benzoat 0,18g, Ethanol 98% 1,8ml, Distilled water incense 60ml.

Effects: -Skin antiseptic for wounds from ezema, skin diseases caused by fungi virus varicella zoster diseases like chicken pox or zona, and children withprickly heat

Dose and Usage:-Skin antiseptic:
 +**Herpes wounds, itchness, and prickly heat:** mix 1 spoon of medicine with 4 spoons ofwater to wash the wounds
 +**Zona, finger or leg fungus, chickenpox:** apply the medicine directly. Can be used many time in the day

Contraindications: None
Side effects: None
Storage: A dry, cool, protected from light, temperatures below 30°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

Số lô sản xuất :
NSX :
HSD :

Dung dịch dùng ngoài

MANGINO VIM
30ml

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
 Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 Để xa tầm tay trẻ em.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Công thức: Dịch chiết lá xoài 0,2% : 15 ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03 g, Camphor 0,12 g, Menthol 0,06 g, Natri benzoat 0,18 g, Ethanol 98% 1,8 ml, Nước cất vừa đủ 30 ml.

Chỉ định: Chống các bệnh da liễu như: chàm, vẩy nến, nấm da, thủy đậu, rôm sảy, giời leo.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất theo: TCCS - SDK:





Formula: Extract from mango leafs 0,2% : 15ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03g, Camphor 0,12g, Menthol 0,06g, Natri benzoat 0,18g, Ethanol 98% 1,8ml, Distilled water incense 60ml.

Effects: -Skin antiseptic for wounds from ezema, skin diseases caused by fungi virus varicella zoster diseases like chicken pox or zona, and children withprickly heat

Dose and Usage:-Skin antiseptic:
+Herpes wounds, itchiness, and prickly heat: mix 1 spoon of medicine with 4 spoons ofwater to wash the wounds
+Zona, finger or leg fungus, chickenpox: apply the medicine directly, Can be used many time in the day

Contraindications: None
Side effects: None
Storage: A dry, cool, protected from light, temperatures below 30°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

Công thức: Dịch chiết lá xoài 0,2% : 15 ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03 g, Camphor 0,12 g, Menthol 0,06 g, Natri benzoat 0,18 g, Ethanol 98% 1,8 ml, Nước cất vừa đủ 30 ml.

Chỉ định: - Sốt trùng ngoài da trong một số tổn thương da như: chàm, vẩy nến, nám da, thủy đậu, rôm sảy, gời leo.

Liều lượng và cách dùng:
+ Có thể xịt trực tiếp vào vết thương 2 lần trong ngày.
+ Pha loãng theo tỉ lệ 1:4 để rửa vết thương * 1 ml pha loãng với nước thành 4 ml dung dịch để rửa*.

Chống chỉ định: Bỏng, vết thương hở, người dị ứng với các thành phần của thuốc.
Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rât.
Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Sản xuất theo: TCCS - SĐK:

Số lô sản xuất :
NSX :
HSD :





TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

MANGINOVIM

DDDN Manginovim là sản phẩm của Công Ty CP Y Dược phẩm VIMEDIMEX uy quyền cho Công ty cổ phần Dược Nature Việt Nam đăng ký, sản xuất và phân phối.

Thành phần: cho 30ml	15,00 ml
Dịch chiết lá Xoài 0,2%	1,20 ml
Tween 80	0,03 g
Acid benzoic	0,12 g
Camphor	0,060 g
Menthol	0,18 g
Natri benzoat	1,80 ml
Ethanol 98%	30 ml
Nước cất vđ	

Chỉ định:

- Sát trùng ngoài da trong một số tổn thương da như: chàm, vẩy nến, nám da, thủy đậu, rôm sảy, gời leo.

Liều lượng và cách dùng:

1. Có thể xịt trực tiếp vào vết thương 2 lần trong ngày.
2. Pha loãng theo tỷ lệ 1:4 để rửa vết thương (1 ml pha loãng với nước thành 4 ml dung dịch để rửa).

Chống chỉ định: Bỏng, vết thương hở, người dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.

Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Đóng gói: Hộp 1 chai dạng xịt 30 ml, 60ml

Sản xuất theo: TCCS

- *Để tránh xa tầm tay trẻ em*
- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*
- *Thông báo cho Bác Sĩ, Dược Sĩ nếu gặp phải bất kỳ triệu chứng bất thường nào.*

Công ty CP Dược Nature Việt Nam

19 Đường 18, Kp. 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM,
ĐT: 08-62838556, Fax: 08-62838557



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh