

Nhãn chai Mephenesin (Dài x Rộng): 109 x 40mm

Thành phần:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Mephenesin.....250mg

Tá dược v.d.....1 viên.

Composition:

Each film coated tablet contains:

Mephenesin.....250mg

Excipients q.s.....1 tablet.

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Indications, contra-indications, dosage, administration:

Please refer to enclosed package insert.

Thuốc bán theo đơn

WHO / GMP

Thuốc dùng trong bệnh viện

MEPHENESIN 250-US

Mephenesin 250mg

USP

US PHARMA USA

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chai 200 viên nén bao phim

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Specification: In house.

SDK (Reg. No.):

Số lô SX (Batch No.):

Ngày SX (Mfd.):

HD (Exp.):

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/18/2014

403/0126

Composition: Each film coated tablet contains: Mephesisin.....250 mg Excipients q.s.....1 tablet.		
Indications, contra-indications, dosage, administration: Please refer to enclosed package insert.		
Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. <i>Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use.</i>		
Specification: Manufacturer.	Manufacturer:	
	US PHARMA USA COMPANY LIMITED	
	Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi	
	Industrial Zone, HCM City, Viet Nam	


SĐK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mfd): HD (Exp):	 MEPHENESIN 250-US  US PHARMA USA <u>Mephenesin 250mg</u> Hộp 4 vỉ x 25 viên nén bao phim	Rx) Thuốc bán theo đơn WHO / GMP
---	--	--

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Mephesisin.....250 mg Tá dược vđ.....1 viên.	
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.	
Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. <i>Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</i>	
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.	

Vĩ Mephenesin 250-US (Dài x Rộng): 109 x 67mm



Composition: Each film coated tablet contains: Mephenesin.....250mg Excipients q.s.....1tablet.	Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use.	 US PHARMA USA Manufacturer: US PHARMA USA COMPANY LIMITED Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Indications, contra-indications, dosage, administration: Please refer to enclosed package insert.	Specification: Manufacturer.	

SDK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mfd.): HD (Exp.):	 Thuốc bán theo đơn		 
	 MEPHENESIN 250-US		
 US PHARMA USA		Mephenesin 250mg Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim	
Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Mephenesin.....250mg Tá dược v.d.....1 viên.	Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 	 US PHARMA USA Nhà sản xuất CÔNG TY TNHH US PHARMA USA Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.	
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.			

Vĩ Mephenesin 250-US (Dài x Rộng): 109 x 67mm

[illegible]



Thuốc bán theo đơn

MEPHENESIN 250-US

Viên nén bao phim Mephenesin 250mg

Thành phần

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Mephenesin 250mg

Tá dược: CaCO₃ nặng, Polyvinyl pyrrolidon, Magnesi stearate, Natri starch glycolate, Polyethylen glycol 6000, Hydroxypropylmethyl cellulose 606, Hydroxypropylmethyl cellulose 615, Titan dioxyd, Talc, Sunset yellow lake, Erythrosin lake.

Phân loại

Thuốc giãn cơ.

Dược lực, cơ chế tác dụng

Thuốc thư giãn cơ có tác động trung ương.

Dược động học

Sau khi uống, Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ.

Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan.

Mephenesin có nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi.

Chỉ định

MEPHENESIN 250-US được đề nghị điều trị hỗ trợ các trường hợp co rút cơ gây đau như :

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, vẹo cổ, đau vùng thắt lưng.
- Các tình trạng co rút cơ xương khác.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Liều lượng và cách dùng

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 15 tuổi.

Uống 2 - 4 viên x 3 lần / ngày. Uống với một chút nước.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Thận trọng:

Các tác dụng ngoại ý có liên quan thuốc thường sẽ nặng lên khi dùng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương.

Tương tác thuốc

Tác động lên hệ thần kinh trung ương của MEPHENESIN 250-US có thể gia tăng bởi rượu hoặc các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương.

Thời kỳ mang thai

Không nên dùng thuốc này trong thời gian mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Không dùng thuốc này trong thời gian cho con bú.

Ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc:

Vì thuốc có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác cho nên người bệnh sử dụng MEPHENESIN 250-US không được lái xe và vận hành máy móc.



M

Tác dụng phụ

Thường gặp, $ADR > 1/100$

Mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động

Ít gặp, $1/1000 < ADR < 1/100$

Đau khớp, đau người, buồn nôn, bức tức, ỉa chảy, táo bón, nổi mẩn.

Hiếm gặp, $ADR < 1/1000$

Phản ứng dị ứng. Sốc phản vệ rất hiếm xảy ra. Ngủ gà, phát ban.

Hướng dẫn cách xử trí ADR : Giảm liều hoặc ngừng điều trị bằng Mephenesin.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng:

- Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê.

- Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già.

Điều trị:

- Trong tất cả các trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cẩn thận về hô hấp, mạch và huyết áp.

- Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển đến cơ sở điều trị có đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu.

- Tiến hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ trợ chung, đảm bảo thông khí, truyền dịch.

- Có thể điều trị ức chế hệ thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thuốc điều trị thích hợp.

- Trường hợp người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa.

Dạng trình bày

Hộp 2 vỉ, vỉ 25 viên.

Hộp 4 vỉ, vỉ 25 viên.

Chai 200 viên.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

Công Ty TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860, Fax: 08 37908856



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng

