


2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ



Nhãn chai 30 viên nén dài bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 500mg
Tá được v.đ1 viên nén dài bao phim
CHỈ ĐỊNH: Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.
LIỀU DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 50 viên nén dài bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 500mg
Tá được v.đ1 viên nén dài bao phim
CHỈ ĐỊNH: Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.
LIỀU DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 100 viên nén dài bao phim

THÀNH PHẦN
Mephenesin 500mg
Tá được v.đ1 viên nén dài bao phim
CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.
LIỀU DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



5 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



5 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



THÀNH PHẦN
Mephenesin 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



5 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 Thuốc bán theo đơn



Mephenesin 500

Mephenesin 500mg

10 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Handwritten signature

 Thuốc bán theo đơn



Mephenesin 500

Mephenesin 500mg

10 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Mephenesin 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



 Thuốc bán theo đơn



Mephenesin 500

Mephenesin 500mg

10 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 □ Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



3 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM





Handwritten signature

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



3 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Mephenesin 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



3 VỈ X 12 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



10 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM





lsh

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



10 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



Mephenesin 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg



10 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM





Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg

 GMP
WHO

5 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



llh

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg

 GMP
WHO

5 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM

THÀNH PHẦN

Mephenesin 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và mọi thông tin chi tiết xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

 Thuốc bán theo đơn

Mephenesin 500
Mephenesin 500mg

 GMP
WHO

5 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 Thuốc bán theo đơn



Mephenesin 500

Mephenesin 500mg

3 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



 Thuốc bán theo đơn



Mephenesin 500

Mephenesin 500mg

3 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM



 Thuốc bán theo đơn



Mephenesin 500

Mephenesin 500mg

3 VỈ X 10 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM





Handwritten signature

THÀNH PHẦN
Mephenesin 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH
Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

LIỀU DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Rx Thuốc bán theo đơn**VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM MEPHENESIN 500****Thành phần**

Mephenesin

500mg

Tá dược v.đ

1 viên nén dài bao phim

(Polyvinyl pyrrolidon, Canxi carbonat, Magnesi stearat, Aerosil, Talc, Titan Dioxyd, Ethanol 96%, Hydroxypropyl methylcellulose, PEG 6000, Ponceau 4R, Quinolin yellow)

Quy cách đóng gói

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 3 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 5 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 10 vỉ
7	Đóng chai 30 viên
8	Đóng chai 50 viên
9	Đóng chai 100 viên

Dược lực học

Mephenesin là thuốc thư giãn cơ có tác dụng Trung ương.

Mephenesin gây thư giãn cơ và trấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bế thần kinh cơ có tác dụng toàn thân và cũng có tác dụng tại nơi thuốc tiếp xúc. Lợi ích của thuốc bị hạn chế do thời gian tác dụng ngắn.

Dược động học

Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết ở các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ.

Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi.

Chỉ định

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau cơ cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

Liều dùng

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định

Người bệnh quá mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.

Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Thận trọng

Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử dị ứng, hen phế quản, tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận.

Các tác dụng ngoại ý có thể tăng lên khi dùng cùng với rượu và các thuốc ức chế thần kinh Trung ương.

Người lái xe và vận hành máy móc cần lưu ý khi dùng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng phụ

Một vài trường hợp gây sốc phản vệ; hiếm gặp: buồn ngủ, buồn nôn, dị ứng da.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của Mephenesin có thể tăng cường nếu trong thời gian dùng thuốc có uống rượu hoặc dùng các chất ức chế thần kinh khác

Sử dụng quá liều

Triệu chứng: Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê. Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già

Điều trị: Trong tất cả các trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cẩn thận về hô hấp, mạch và huyết áp.

Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị có đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu.

Tiến hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ trợ chung, đảm bảo thông khí, truyền dịch. Cũng có thể điều trị ức chế thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thuốc điều trị thích hợp.

Trường hợp người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyển ngay đến cơ sở chuyên khoa.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30⁰C.
- TC áp dụng: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 19 tháng 01 năm 2012

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu