


202/Đ144

Hộp Mephenesin 500-HV
68x30 x 110 mm

Rx WHO - GMP Mephenesin 500 -HV Mephenesin 500mg 5 vỉ x 12 viên nén bao phim	Rx Prescription drug WHO - GMP Mephenesin 500 -HV Mephenesin 500mg Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use. 5 blisters x 12 film coated tablets	BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ĐÃ PHÊ DUYỆT Lần đầu: 14 / 3 / 2014 Nh
	Composition: Each film coated tablet contain: Mephenesin.....500mg Excipients q.s..... 1 tablet Indications, contra-indications, dosage, administration: Please refer to enclosed package insert. Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. Specification: Manufacturer. USP Manufacturer: US PHARMA USA COMPANY LIMITED Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.	
	Rx Thuốc bán theo đơn WHO - GMP Mephenesin 500 -HV Mephenesin 500mg Đã xem tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 5 vỉ x 12 viên nén bao phim	SDK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mfd.): HD (Exp.):
	Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Mephenesin.....500mg Tá dược vđ.....1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất. USP Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA Lot B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.	

Vỉ: 67 x 108 mm



Chai Mephenesin 500-HV: 54 x 170mm

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Mephenesin.....500mg Tá dược v.d.....1 viên. Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng. Xem tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ: dưới 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.	R_x Thuốc được theo dõi sát WHO - GMP Mephenesin 500 -HV Mephenesin 500mg 250 viên nén bao phim	Composition: Each film coated tablet contains: Mephenesin.....500mg Excipients q.s.....1 tablet. Indications, contra-indications, dosage, administration: Please refer to enclosed package insert. Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. Specification: Manufacturer Keep out of reach of children Read the package insert carefully before use SBK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mfg): HĐ (Exp):
---	--	--



Handwritten signature



MEPHENESIN 500-HV

Viên nén bao phim Mephenesin 500mg

Thành phần

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Mephenesin 500 mg

Tá dược: Canxi carbonat, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, Natri starch glycolate, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 606, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 615, Titan dioxyd, Polyethylen glycol 6000, Màu Sunset yellow lake, Màu Erythrosin lake.

Phân loại

Thuốc giãn cơ.

Dược lực, cơ chế tác dụng

Thuốc thư giãn cơ có tác động trung ương.

Dược động học

Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết ở các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ

Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan

Mephenesin có nửa đời thải trừ khoảng 45 phút

Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng chưa biến đổi

Chỉ định

MEPHENESIN 500-HV được đề nghị điều trị hỗ trợ các trường hợp co rút cơ gây đau như :

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, vẹo cổ, đau vùng thắt lưng.
- Các tình trạng co rút cơ xương khác.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Liều lượng và cách dùng

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 15 tuổi.

Uống 1 - 2 viên x 3 lần / ngày. Uống với một chút nước.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Thận trọng

Các tác dụng ngoại ý có liên quan thuốc thường sẽ nặng lên khi dùng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương.

Lái xe và vận hành máy móc

Thuốc có thể gây buồn ngủ nên thận trọng đối với người lái xe và điều khiển máy móc.

Tương tác thuốc

Tác động lên hệ thần kinh trung ương của MEPHENESIN 500-HV có thể gia tăng bởi rượu hoặc các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương.

Thời kỳ mang thai

Không nên dùng thuốc này trong thời gian mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Không nên dùng thuốc này trong thời gian cho con bú.

Tác dụng phụ

Một vài trường hợp ngoại lệ được ghi nhận có gây sốc phản vệ.



Hiếm khi bị buồn ngủ, buồn nôn, nôn, dị ứng da.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Triệu chứng : giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, không phối hợp được động tác, liệt hô hấp.

Cấp cứu : chuyển ngay đến bệnh viện và điều trị triệu chứng.

Dạng trình bày

Hộp 5 vỉ x 12 viên.

Chai 250 viên

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

Công Ty TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

