

8/15865

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 5 / 8 / 2013

MẪU NHÃN TUÝP
TUÝP 3,75g

THUỐC BÁN THEO ĐƠN
MICROXATIVE Trẻ em
MICROXATIVE Trẻ em
MICROXATIVE Trẻ em
MICROXATIVE Trẻ em

Công thức: cho 10g gel:
Sorbitol 100% 5,00g
Natri citrat 0,72g
Tà được vd 10g
Sẵn xuất tại:
C.TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TỰ 2 - DIPHARMA

Đào quản: Nơi khô,
nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

SDK
NSC
Số B.S.
HD



MẪU HỘP CHỨA 6 TUÝP 3,75g

TRẺ EM



GMP
WHO

MICROXATIVE

MICROXATIVE

TRẺ EM

SDK:

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị chứng táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.
- Chuẩn bị nội soi trực tràng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

GEL THỤT NHUẬN TRẮNG

MICROXATIVE

GMP
WHO



6 TUÝP x 3,75g

TRẺ EM



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Công thức: cho 10g gel:
Sorbitol 100% 5,00g
Natri citrat 0,72g
Tá dược vđ 10g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - VIỆT NAM
ĐT: 04.39715439 FAX: 04.38211815
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - VIỆT NAM
ĐT: 04.39716291 FAX: 04.35251484

NSX :
Số Lô SX :
HD :



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

GEL THỤT NHUẬN TRẮNG

MICROXATIVE

GMP
WHO



6 TUÝP x 3,75g

TRẺ EM



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

MẪU NHÃN TUÝP

TUÝP 6,25g



MẪU HỘP

CHỨA 6 TUÝP 6,25g



MICROXATIVE

NGƯỜI LỚN

SDK :

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị chứng táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.
- Chuẩn bị nội soi trực tràng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

GEL THỤT NHUẬN TRĂNG

MICROXATIVE

NGƯỜI LỚN

GMP WHO

Công thức: cho 10g gel:
Sorbitol 100% 5,00g
Natri citrat 0,72g
Tá dược vđ 10g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thành Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - VIỆT NAM
ĐT: 04.39715439 FAX: 04.38211815
Sân xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - VIỆT NAM
ĐT: 04.39716291 FAX: 04.35251484

NSX :
Số Lô SX:
HD :



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

GEL THỤT NHUẬN TRĂNG

MICROXATIVE

NGƯỜI LỚN

GMP WHO



6 TUÝP x 6,25g

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

(Rx) THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Gel thực nhuận tràng

GMP - WHO

MICROXATIVE



TRÌNH BÀY: Hộp 6 tuýp mỗi tuýp 6,25g,
Hộp 6 tuýp mỗi tuýp 3,75g.

CÔNG THỨC: cho 10g gel:

Sorbitol 100%.....5,00g

Natri citrat0,72g

Tá dược (Natri laurylsulfat, macrogol,
acid sorbic, nước cất).....vd 10g

CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:

Thuốc sở kích thích, làm mềm phân theo cơ chế lý hóa (Peptit hóa phân).

Các đặc tính dược động học:

Thuốc hấp thu rất kém qua đường tiêu hoá.

Thời gian thuốc bắt đầu có tác dụng là 5 - 20 phút sau khi thực.

CHỈ ĐỊNH:

> Điều trị chứng táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.

> Chuẩn bị nội soi trực tràng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng trong các bệnh thực thể (viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn), hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

CÁCH DÙNG:

Dùng trước thời điểm dự định đi cầu 5 - 20 phút, người lớn mỗi lần dùng một tuýp 6,25g, trẻ em mỗi lần dùng một tuýp 3,75g.

Mở nắp đầu thực.

• Bóp nhẹ cho ra một giọt thuốc ở đầu, bôi nhẹ lên thân đầu thực để làm trơn.

• Đưa từ từ đầu của đầu thực vào trực tràng đến ngập hết phần thân đầu thực (bệnh nhân ở tư thế nằm hoặc làm sao để hậu môn hướng lên trên, tránh chảy thuốc ra ngoài).

• Bóp mạnh để đẩy hết thuốc vào trực tràng, trong khi rút ống ra vẫn bóp để giữ ống.

• Nếu bóp chưa hết thuốc thì thao tác lại.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG:

Tránh dùng thuốc trong đợt cấp của trĩ, rò hậu môn, viêm đại tràng xuất huyết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Có thể bị ỉa chảy và đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có "đại tràng kích thích" hoặc trường bụng.

- Dùng kéo dài có thể gây cảm giác rất nóng tại chỗ và rất hân hữu gây viêm đại tràng xuất huyết.

THÔNG BÁO VỚI BÁC SỸ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI DÙNG THUỐC.

TƯƠNG TÁC THUỐC: chưa được ghi nhận.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Dùng nhiều liều lặp lại có thể dẫn đến rối loạn nước và điện giải. Cần bù nước và điện giải nếu cần.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - VIỆT NAM

ĐT: 04.39715439

FAX: 04.38211815

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - VIỆT NAM

ĐT: 04.39716291

FAX: 04.35251484



Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

Giám Đốc *Tung*



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

