

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Neocin

THUỐC NHỎ MẮT



CÔNG THỨC

- Neomycin sulfat 25 mg (#17000IU)
- Tá dược: Natri citrat, propylen glycol, natri clorid, phenyl mercuric nitrat, nước cất.....vừa đủ 1 lọ 5 ml.

CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh nhiễm trùng ở mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin như: viêm kết mạc, giác mạc, viêm mí mắt, viêm tì lệ.
- Các bệnh nhiễm trùng mắt trước hoặc sau khi phẫu thuật mắt và sau chấn thương.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Nhiễm trùng nặng: Nhỏ 2 - 4 giọt mỗi giờ.
- Liều thông thường: Nhỏ 2 giọt/ lần, ngày 3 - 4 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bị dị ứng với Neomycin.

LƯU Ý - THẬN TRỌNG

Không nên dùng lâu dài vì thuốc có thể gây dị ứng da.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Có thể xảy ra dị ứng chéo với các aminoglycosid khác.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Chưa thấy báo cáo.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa thấy báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thuốc có thể gây dị ứng như viêm da, ngứa, rất hiếm gây sốt hay sốc phản vệ.

- * Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Chưa thấy báo cáo.

DƯỢC LỰC HỌC

- Neomycin là một kháng sinh diệt khuẩn thuộc nhóm aminosid, có hoạt tính trên phần lớn những chủng gây bệnh liên quan đến nhiễm trùng mắt.
- Phổ kháng khuẩn của Neomycin bao gồm Staphylococcus, Gonococcus, Acinetobacter, Brucella, Escherichia coli, Haemophilus, Klebsiella, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Neomycin hấp thu kém qua đường tiêu hoá. Sau khi dùng tại chỗ, lượng thuốc hấp thu không đủ để tạo ra tác dụng toàn thân. Sau khi hấp thu, neomycin nhanh chóng thải ra thận ở dạng hoạt tính.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NEU CẦN THIÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

TRÌNH BÀY: Hộp 1 lọ 5ml.

HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

BẢO QUẢN

- Ở nhiệt độ không quá 30°C.
- Đóng nắp kín ngay sau khi dùng.
- Chỉ sử dụng trong 15 ngày sau khi mở nắp.