



Silymarin 100

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nang mềm chứa:

Thành phần hoạt chất:

Cao bột quả *Carduus marianus*

(*Extractum Fructus Cardui mariae siccum*) 200 mg

(tương đương Silymarin 100 mg, Silybin 60 mg)

Thành phần tá dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, nước tinh khiết, ethyl vanillin, titan dioxyd, allura red AC, tartrazin, sunset yellow FCF, brilliant blue FCF.

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nang mềm hình thuôn, màu xanh lá vàng, bên trong chứa dịch thuốc màu nâu.

CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị viêm gan mạn tính, xơ gan và nhiễm độc gan.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Cách dùng: Dùng đường uống.

Liều dùng: Trên 12 tuổi: 1 viên x 2 hay 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân vàng da tắc mật và xơ gan ứ mật tiên phát.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Dùng thuốc theo đúng liều lượng đã được chỉ dẫn.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thời kỳ mang thai: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Thời kỳ cho con bú: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú vì chưa có thông tin đầy đủ về sự an toàn của thuốc cho đối tượng này.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của các thuốc dùng đồng thời do chức năng gan được cải thiện; Có thể làm tăng tác dụng chống loạn nhịp của amiodarone.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn và tiêu chảy nhẹ; Phản ứng quá mẫn như ban da dị ứng, ngứa và khó thở.

* Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

- Điều kiện bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, KCN Việt Nam–Singapore, Thuận An, Bình Dương.



Silymarin 100



Keep out of reach of children

Read insert paper carefully before use

COMPOSITION

Each soft capsule contains:

Active ingredient:

Carduus marianus extract

(*Extractum Fructus Cardui mariae siccum*) 200 mg

(equivalent to 100 mg Silymarin, 60 mg Silybin)

Inactive ingredients: Soybean oil, lecithin oil, palm oil, white beeswax, gelatin, concentrated glycerin, D-sorbitol 70%, purified water, ethyl vanillin, titanium dioxide, allura red AC, tartrazin, sunset yellow FCF, brilliant blue FCF.

PHARMACEUTICAL FORM

Yellow green oblong soft capsule containing brown substance.

INDICATIONS

For the supportive treatment of chronic inflammatory liver diseases, hepatic cirrhosis and toxic liver damage.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Administration: Oral route.

Dosage: >12 years: 1 capsule x 2 or 3 times/day.

CONTRAINDICATIONS

Patients with obstructive jaundice and primary biliary cirrhosis.

WARNINGS AND CAUTIONS FOR USE

It should be followed the dosage & administration.

PREGNANCY AND LACTATION

Use in pregnancy: There are no data about taking the drug in pregnancy. It should be only used if the benefits outweigh the risks.

Use in lactation: Caution is advised in lactation woman because there are no adequate data about the safety of the drug in lactation woman.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINE

There are no data about proven influence of the drug on ability to drive or operate machinery.

DRUG INTERACTIONS AND INCOMPATIBILITIES

The metabolism of concomitant used medicinal products can be affected caused by improvement of the hepatic function; The antiarrhythmic effect of amiodarone can be increased.

UNDESIRABLE EFFECTS

Gastrointestinal complaints like nausea and a mild laxative effect; Hypersensitivity reactions like exanthema, pruritus and dyspnoea.

** Inform your doctor or pharmacist immediately in case of any undesirable effects related to drug use.*

OVERDOSE AND TREATMENT

There are no reports, it does not exceed the prescribed dose.

PACKAGE

Box of 12 blisters x 5 soft capsules.

STORAGE, SHELF LIFE AND SPECIFICATION

- Storage: In a hermetic container, dry and cool place, below 30⁰C, protect from light.
- Shelf life: 36 months from the manufacturing date.
- Specification: In-house.

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER

PHIL INTER PHARMA CO., LTD.

No. 25, Street No. 8, Vietnam – Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.

