

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

3,7g x 30 SACHETS

Dioclahedral Smeclite - 3g

Stanmece

Stanmece
Dioclahedral Smeclite - 3g

THÀNH PHẦN: LƯỖI GỒI CÓ CHỨA
DIOCTAHEDRAL SMECTITE 3g
TÁ DƯỢC VỮA ĐỦ 3,7g

CÔNG DỤNG, LƯU DỤNG,
CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
XEM TRONG ĐƠN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TIÊU CHUẨN SỐ SỞ
BẢO QUẢN: ĐỂ NƠI KHÔ, TRÁNH ÁNH
SÁNG, NHIỆT ĐỘ TỪ 15 - 30°C.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XÀ TẮM TAY TRẺ EM

 **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**
415 Hà Thành - Nam Định
Mã số thuế: 030 369408 - Fax: 0350 364466

Stanmece
Dioclahedral Smeclite - 3g



GÓI 3,7G THUỐC BỘT x 30 GÓI



Stanmece
Dioclahedral Smeclite - 3g

COMPOSITION: Each sachet contains:
Dioclahedral Smeclite 3g
Excipients q.s. 3,7g

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS
SIDE EFFECTS, DOSAGE:
As directed by the physician.

SPECIFICATION: In-house

STORAGE: STORE IN A DRY PLACE,
PROTECT FROM LIGHT, TEMPERATURE 15 - 30°C

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USE.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 18 / 01 / 2018

CÔNG TY CPDP NAM HÀ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS.DH: Hoàng Kim Tuyết

MẪU NHÃN TÚI XIN ĐĂNG KÝ

Gói 3,7g thuốc bột Stanmece Diocathedral Smectite - 3g THÀNH PHẦN: MỖI GÓI CÓ CHỨA DIOCTAHEDRAL SMECTITE3G TÁ DƯỢC VỪA ĐỦ 3,7G CÔNG DỤNG, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: XEM TRONG ĐƠN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. BẢO QUẢN: ĐỂ NƠI KHÔ, TRÁNH ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ TỪ 15 - 30°C. SDK:  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 415 Hàn Thuyên - Nam Định Tel: 0350 3649408 - Fax: 0350 3644650	Stanmece Diocathedral Smectite - 3g   NAMHA PHARMA Số lô SX: Hạn dùng:
---	--

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThSDH: *Hoàng Kim Tuyết*

DT

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đề xa tầm tay trẻ em

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

STANMECE

CÔNG THỨC:

Diocahedral smectite

3 g

Tá dược vừa đủ

1 gói

Tá dược gồm: Glucose, Aspartam, Vanilin, Magnesi stearat

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Gói 3,7g, hộp 30 gói

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Stanmece không được hấp thu vào máu qua đường tiêu hoá và bị thải trừ hoàn toàn theo phân.

DƯỢC LỰC HỌC:

Stanmece là silicat nhôm và magnesi tự nhiên có cấu trúc từng lớp lá mỏng xếp song song với nhau và có độ quán tính cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ niêm mạc đường tiêu hoá.. Stanmece tương tác với glycoprotein của chất nhầy làm tăng sức chịu đựng của lớp gel dính trên niêm mạc khi bị tấn công. Nhờ tác động trên hàng rào niêm mạc tiêu hoá và khả năng bám cao nên Stanmece bảo vệ được niêm mạc tiêu hoá. Stanmece không cản quang, không nhuộm màu phân, và với liều lượng thông dụng Stanmece không làm thay đổi thời gian vận chuyển sinh lý của ruột.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng.
 - Ỉa chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn ỉa chảy kéo dài.
- Stanmece không nên dùng trong điều trị tiêu chảy cấp cho trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng chữa ỉa chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời gian và tỷ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống Stanmece khoảng 2 – 3 giờ.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gây ra hoặc làm tăng táo bón nhưng rất hiếm, điều trị vẫn có thể tiếp tục với liều lượng giảm.

Ghi chú: “Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

* Trẻ em:

- Dưới 1 tuổi ngày 1 gói chia 2 – 3 lần.
- Từ 1 - 2 tuổi ngày 1- 2 gói chia 2 -3 lần.
- Trên 2 tuổi ngày 2 – 3 gói chia 2 – 3 lần.

DT

Hoà mỗi gói thuốc với khoảng 50 ml nước, trước mỗi lần dùng thuốc cần lắc hoặc khuấy đều.
Có thể thay nước bằng dịch thức ăn như canh, nước rau..

* Người lớn:

Mỗi lần 1 gói, hoà vào nửa cốc nước ấm, khuấy đều rồi uống ngày 3 lần.

Trường hợp tiêu chảy cấp liều khởi đầu có thể gấp 2 lần.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác.

Riêng viêm loét trực tràng dùng cách thụt.

* Thụt trực tràng:

Mỗi lần 1 – 3 gói hoà với 50 đến 100 ml nước ấm, rồi thụt. Ngày 1 – 3 lần.

THẬN TRỌNG:

Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.

Phải bù nước nếu cần (bằng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) tùy theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và mức độ trầm trọng của tiêu chảy. Cần thận trọng khi dùng Stanmece để điều trị ỉa chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong ỉa chảy cấp.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Triệu chứng: Dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.

Xử trí: Cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ 15°C - 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.



NAMHA PHARMA

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

415 Hàn Thuyên Nam Định

Tel: 0350.3649408. Fax: 0350.3644650



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThSDH: *Hoàng Kim Tuyết*

DT