

MẪU NHÃN THUỐC
NHÃN HỘP

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2018

tadadecon

R_x THUỐC BÁN THEO ĐƠN Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim

tadadecon

GMP-WHO Mephenesin.....250 mg

COPHAVINA Chi nhánh CTCP Armephaco
XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150
112 Trần Hưng Đạo - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh

Phân phối bởi:
CTY. DƯỢC PHẨM THÀNH BẮT
498/6 Cầu Long, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Tỷ lệ: 100%

THÀNH PHẦN:
Mephenesin.....250mg
Tá dược.....1 viên nén bao phim

**Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng-cách
dùng và các thông tin khác:**
xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM**
BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ 15°C - 30°C tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
SBK/Reg.No.

R_x SOLD ONLY BY PRESCRIPTION Box of 2 blisters x 25 film-coated tablets

tadadecon

GMP-WHO Mephenesin.....250 mg

COPHAVINA Armephaco JSC branch
PHARMACEUTICAL FACTORY 150
112 Tran Hung Dao Street - Dist 1 - Ho Chi Minh City

Distributor:
THÀNH BẮT PHARMA
498/6 Cầu Long St., Tân Bình Dist., HCMC.

COMPOSITION:
Mephenesin.....250mg
Excipient.....1 film-coated tablet

**Indications, contraindications, dosage-
administration:**
see leaflet inside for further informations.

CAREFULLY READ INSTRUCTIONS BEFORE USE
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
STORAGE: Store in a dry place, temperature 15°C - 30°C,
protect from light.
Specification: Manufacturer's

NSX (Mfg date):
Số lô SX (Batch No):
HD (Exp. date):

Ngày 05 tháng 11 năm 2012
Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Thị Kim Hằng

MẪU NHÃN THUỐC

NHÃN VỈ



Tỷ lệ: 100%

Ngày 05 tháng 11 năm 2012
Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Thị Kim Hằng

01

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TADADECON

Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:

- * Mephenesin 250mg
Maize starch (Tinh bột ngô), Lactose, Avicel, Croscarmellose natri, Bột talc, Magnesi stearat, Hydroxy propylmethylcellulose (HPMC), Polyethylen glycol 6000 (PEG 6000), Titan dioxyd,
Jaune orangé S, Rouge cochenille A.....v.đ 1 viên nén bao phim

*** Được lực học:**

Thuốc thư giãn cơ có tác động trung ương.

*** Được động học:**

Sau khi uống, mephenesin được hấp thu nhanh. Nồng độ tối đa trong máu đạt được sau 1 giờ. Thời gian bán thải là $\frac{3}{4}$ giờ. Mephenesin được chuyển hóa mạnh và được đào thải chủ yếu qua nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH:

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Rối loạn chuyển hóa porphyrine.

*** Thận trọng:**

- Những người bệnh có tiền sử dị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng với thuốc, đặc biệt dị ứng với aspirin.
- Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận
- Sử dụng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm các tác dụng không mong muốn có liên quan đến thuốc tăng thêm.
- Do thuốc có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác cho nên người bệnh sử dụng mephenesin không được lái xe và điều khiển máy móc.

LIỀU DÙNG:

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 15 tuổi : uống 2 - 4 viên/ lần, ngày 3 lần.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Mephenesin dạng uống có thể có những tác dụng không mong muốn như co giật, run rẩy, co cứng bụng, buồn nôn, toát mồ hôi. Triệu chứng này thường xảy ra ở những người bệnh phải dùng thuốc kéo dài.

Thường gặp

- Mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động

Ít gặp



ĐƯỢC

HT

- Đau khớp, đau người, buồn nôn, bức tức, ỉa chảy, táo bón, nổi mẩn. Một vài trường hợp khác bị mất cảm giác ngon miệng, nôn mửa, ảo giác kích động và có thể sốc phản vệ.

Hiếm gặp:

- Phản ứng dị ứng. Sốc phản vệ rất hiếm xảy ra.
- Ngủ gà, phát ban

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của mephenesin có thể tăng cường nếu trong thời gian dùng thuốc có uống rượu hoặc dùng các chất ức chế hệ thần kinh khác.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không nên dùng cho phụ nữ có thai hoặc trong thời kỳ cho con bú.

QUÁ LIỀU – XỬ TRÍ:

- Triệu chứng: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, không phối hợp được động tác, liệt hô hấp.

* *Xử trí:* Chuyển ngay đến bệnh viện và điều trị triệu chứng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: không sử dụng vì có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

- **Hạn dùng** : 24 tháng, kể từ ngày sản xuất.
- **Bảo quản** : Để nơi khô, nhiệt độ 15⁰C – 30⁰C, tránh ánh sáng.
- **Tiêu chuẩn** : Tiêu chuẩn cơ sở.

TRÌNH BÀY:

Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim



Chi nhánh CTCP Armephaco

XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150

112 Trần Hưng Đạo - Q1 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT : (08) 38367413 - 38368554

Fax : 84 - 8 - 8368437



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Ngày 05 tháng 11 năm 2012
Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Thị Kim Hằng

DT