


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/03/2018

Thuốc tra mắt
(Hộp 1 lọ x 5ml)

1/ Nhãn chai:



2/ Nhãn hộp:



MẪU TOA HƯỚNG DẪN

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx: Thuốc bán theo đơn **TELBIREX**

THÀNH PHẦN: Cho lọ 5ml.

Tobramycin	15 mg
Acid boric	22,5 mg
Natri borat	42,5 mg
Thiomersal	1 mg
Sodium calcium edetate	12,5mg
Natrimeta bisulfit	12,5 mg
Natri clorid	45 mg
Menthol	0,05 mg
Riboflavin natri phosphat	0,2 mg
Nước cất vừa đủ	5 ml

DƯỢC LỰC HỌC:

Tobramycin là một kháng sinh nhóm aminoglycosid thu được từ môi trường nuôi cấy *Streptomyces tenebrarius*. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn. Mặc dù cơ chế tác dụng chính xác chưa biết đầy đủ, nhưng có lẽ thuốc ức chế sự tổng hợp protein ở các vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn không thuận nghịch với các tiểu đơn vị 30S của ribosom.

Nhìn chung, Tobramycin có tác dụng với nhiều vi khuẩn Gram âm hiếu khí và một số vi khuẩn Gram dương hiếu khí. Thuốc không có tác dụng với *Chlamydia*, nấm, virus và đa số các vi khuẩn yếm khí. In vitro, Tobramycin thường tác dụng kém hơn Gentamicin đối với 1 số vi khuẩn Gram âm bao gồm *E. coli* và *Serratia*. Nhưng Tobramycin lại mạnh hơn Gentamicin một chút đối với *Ps.aeruginosa* vốn nhạy cảm với cả hai loại thuốc này.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Tobramycin rất giống Gentamicin về tính chất vi sinh học và độc tính. Chúng có cùng nửa đời thải trừ, nồng độ đỉnh trong huyết thanh, ít liên kết với protein, thể tích phân bố và sự bài tiết chủ yếu qua lọc ở cầu thận. Không phải những chủng vi khuẩn kháng Gentamicin đều kháng Tobramycin.

Tobramycin rất giống Gentamicin về tính chất vi sinh học và độc tính. Sau khi nhỏ mắt, thuốc được hấp thu vào thủy dịch. Nồng độ đỉnh đạt được ở thủy dịch và giác mạc sau khi nhỏ thuốc từ 1-2 giờ.

CHỈ ĐỊNH:

Tobramycin được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các chủng nhạy cảm: Viêm mi mắt, viêm kết mạc, viêm túi lệ, viêm giác mạc...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Với người có tiền sử dị ứng với các kháng sinh loại aminoglycosid, người nghe kém và có bệnh thận.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG:

- Nhiễm khuẩn nhẹ và vừa: Nhỏ 1 giọt vào kết mạc, 4 giờ một lần.
- Nhiễm khuẩn nặng: Nhỏ 1 giọt vào kết mạc, cứ 1 giờ một lần. Tiếp tục điều trị cho tới khi đỡ, sau đó giảm số lần sử dụng.



THẬN TRỌNG:

Trẻ sơ sinh chỉ được dùng Tobramycin khi mắc bệnh nặng đe dọa tính mạng. Tobramycin phải dùng thận trọng đối với phụ nữ mang thai, người bệnh bị thiếu năng thận từ trước, bị rối loạn tiền đình, bị thiếu năng ở ốc tai, sau phẫu thuật và các điều kiện khác làm giảm dẫn truyền thần kinh cơ.

Thuốc chỉ dùng nhỏ mắt, không được tiêm. Sự mẫn cảm khi dùng kháng sinh aminoglycoside dùng tại chỗ có thể xảy ra ở một số bệnh nhân. Ngừng dùng thuốc nếu có phản ứng mẫn cảm xảy ra.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Không sử dụng thuốc sau khi mở lọ 1 tháng.

Không được uống.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thận trọng dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc khi thật cần thiết.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Giống như gentamicin, nếu sử dụng đồng thời hoặc tiếp theo với các chất khác gây độc cơ quan thính giác và thận, có thể làm tăng tính độc của các aminoglycosid. Sử dụng đồng thời Tobramycin với các chất chẹn thần kinh - cơ sẽ phong bế thần kinh - cơ và gây liệt hô hấp.

Khi dùng đồng thời Tobramycin với Carbenicillin sẽ làm tăng tác dụng của nhau.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa tìm thấy tài liệu trong được thư.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Quá mẫn có thể xảy ra và phù giác mạc, trong trường hợp này ngừng dùng thuốc. Đôi khi thấy ngứa và sưng mí mắt. Khi dùng dài ngày có thể dẫn đến sự bội nhiễm các vi khuẩn không nhạy cảm, kể cả nấm. Nếu bội nhiễm xảy ra hãy ngừng dùng thuốc và điều trị bằng liệu pháp thích hợp.

“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Triệu chứng và dấu hiệu quá liều cũng giống như các tác dụng không mong muốn gồm: Ngứa, chảy nước mắt, phù giác mạc.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn.

HÌNH THỨC – CÁCH TRÌNH BÀY:

Đóng trong lọ, hộp 1 lọ x 5ml. Có toa hướng dẫn kèm theo. Đóng trong thùng carton.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc SX theo: TCCS.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

322 - Lý Văn Lâm - P1 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780 3831133 * FAX: 0780 3832676



TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



TRUNG TAM THUOC
CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM VIỆT NAM