

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/3/2016



THÀNH PHẦN

Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước

Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.


Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

Vacopharm

20 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

THUỐC HO - LONG ĐỜM

Vacopharm



THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

lch

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

COUGH & EXPECTORANT

20 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

Vacopharm

Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 50 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon[®]

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

50 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon[®]

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

THUỐC HO - LONG ĐỒM

THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

Handwritten signature

Terpinon[®]

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

50 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon[®]

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

COUGH & EXPECTORANT

Terpinon[®]

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SBK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Hộp 100 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat 50mg

Vacopharm

100 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat 50mg

Vacopharm

THUỐC HO - LONG ĐỒM



THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đồm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

Handwritten signature

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat 50mg

Vacopharm

100 vỉ x 10 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat 50mg

Vacopharm

COUGH & EXPECTORANT

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat 50mg

Vacopharm

Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 10 vỉ x 12 viên nang cứng



THÀNH PHẦN

Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước

Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An


ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 20 vỉ x 12 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

Vacopharm

20 vỉ x 12 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

THUỐC HO - LONG ĐỜM

Vacopharm



THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

Handwritten signature

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

Vacopharm

20 vỉ x 12 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

COUGH & EXPECTORANT

Vacopharm

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

Vacopharm

Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 50 vỉ x 12 viên nang cứng

Terpinon®


Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

50 vỉ x 12 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

THUỐC HO - LONG ĐỒM



THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



leh

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

50 vỉ x 12 viên nang cứng

Terpinon®

Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg

COUGH & EXPECTORANT


Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 100 vỉ x 12 viên nang cứng



THÀNH PHẦN

Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước

Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311


Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để thuốc xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên



Nhãn vỉ 12 viên



Nhãn chai 100 viên nang cứng

THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Terpinon®
100 viên nang cứng
Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg
COUGH & EXPECTORANT
THUỐC HO - LONG ĐỀM

Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

TC áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 200 viên nang cứng

THÀNH PHẦN
Terpin hydrat 100mg
Natri benzoat 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Terpinon®
200 viên nang cứng
Terpin hydrat . . . 100mg
Natri benzoat . . . 50mg
COUGH & EXPECTORANT
THUỐC HO - LONG ĐỀM

Để thuốc xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

TC áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 250 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Terpin hydrat 100mg Natri benzoat 50mg Tá dược v.đ 1 viên nang cứng	 Terpinon [®] 250 viên nang cứng Terpin hydrat . . . 100mg Natri benzoat . . . 50mg COUGH & EXPECTORANT THUỐC HO - LONG ĐỜM GMP WHO Avacopharm	Để thuốc xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
CHỈ ĐỊNH Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.		TC áp dụng: TCCS SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Nhãn chai 500 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Terpin hydrat 100mg Natri benzoat 50mg Tá dược v.đ 1 viên nang cứng	 Terpinon [®] 500 viên nang cứng Terpin hydrat . . . 100mg Natri benzoat . . . 50mg COUGH & EXPECTORANT THUỐC HO - LONG ĐỜM GMP WHO Avacopharm	Để thuốc xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
CHỈ ĐỊNH Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.		TC áp dụng: TCCS SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Nhãn chai 1000 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Terpin hydrat 100mg Natri benzoat 50mg Tá dược v.đ 1 viên nang cứng	 Terpinon [®] 1000 viên nang cứng Terpin hydrat . . . 100mg Natri benzoat . . . 50mg COUGH & EXPECTORANT THUỐC HO - LONG ĐỜM GMP WHO Avacopharm	Để thuốc xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
CHỈ ĐỊNH Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.		TC áp dụng: TCCS SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

TERPINON

Thành phần

Terpin hydrat	100mg
Natri benzoat	50mg
Tá dược v.đ	1 viên nang cứng
(Tinh bột sắn, Magnesi stearat)	

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 10 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 20 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 50 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 100 vỉ
9	Đóng chai 100 viên
10	Đóng chai 200 viên
11	Đóng chai 250 viên
12	Đóng chai 500 viên
13	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Terpin hydrat là thuốc long đàm. Tác dụng bằng cách kích thích tế bào bài tiết của đường hô hấp.

Natri benzoat làm loãng dịch tiết ở phế quản, long đàm.

Chỉ định

Trị các rối loạn trong tiết dịch phế quản, trong các bệnh về phổi, phế quản, long đàm.

Liều dùng và cách dùng:

uống với 1 cốc nước

Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng

Tránh dùng phối hợp với các thuốc gây khô chất dịch phế quản.

Phụ nữ có thai và cho con bú: chỉ sử dụng khi thật cần thiết, cân nhắc kỹ giữa lợi ích và nguy cơ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Táo bón, buồn nôn, dị ứng da, chóng mặt.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Tránh thức uống có rượu, các loại thuốc ho khác.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.



**Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ**

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
Điện thoại: (072) 3826111-3829311

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,
Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

Long An, ngày 02 tháng 11 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

