

24607

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC			Ngày <u>09</u> tháng <u>12</u> năm 2015 K. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  DS. Lê Văn Ninh
SẢN PHẨM	Thekan Hộp 6 vỉ x 10 viên			
KÍCH THƯỚC	Hộp (100 x 47 x 37)mm Vỉ: (96 x 40)mm			
MÀU SẮC	 C:60 M:0 Y:40 K:40	 C:0 M:60 Y:60 K:40	 C:0 M:0 Y:0 K:100	

QL

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nén bao phim THEKAN

Công thức: Cho 1 viên nén bao phim:

Cao khô lá bạch quả (<i>Ginkgo siccus folii extractum</i>)	40 mg
Tương ứng không ít hơn 9,6 mg flavonoid	
Tá dược	vừa đủ 1 viên
Tá dược gồm: Lactose, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, povidon, magnesi stearat, bột talc, Colloidal anhydrous silica, hypromellose, macrogol 6000, titan dioxyd, phẩm màu sắt (III) oxyd, phẩm màu sunset yellow lake, phẩm màu erythrosin lake, ethanol 96%	

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ $\times$ 15 viên; hộp 6 vỉ $\times$ 10 viên.

Chỉ định:

- Thiếu năng tuần hoàn ngoại biên.
- Rối loạn chức năng não với các triệu chứng suy giảm trí tuệ như ù tai, nhức đầu, rối loạn trí nhớ, kém tinh táo, chóng mặt.

Chống chỉ định:

- Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người có rối loạn đông máu, đang chảy máu.
- Phụ nữ có thai; pha nhồi máu tim, não cấp; xuất huyết não.
- Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Thận trọng: Thekan không phải là một thuốc chống cao huyết áp vì vậy không thể dùng thay thế cho các thuốc chống cao huyết áp.

Tương tác thuốc: Không dùng cùng thuốc chi huyết, thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống đông, thuốc chống động kinh, thuốc trầm cảm.

Tác dụng không mong muốn: Một vài rối loạn nhẹ và rất hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Liều dùng và cách dùng:

- Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại biên: Uống 1 viên/ lần, 3 lần mỗi ngày.
- Rối loạn chức năng não: Uống 1 - 2 viên/ lần, 3 lần mỗi ngày.

Liều lượng có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi của bệnh nhân và mức độ nghiêm trọng của triệu chứng.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:



- Phụ nữ có thai: Không dùng.
- Phụ nữ cho con bú: Dùng được.

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng:

- Khi thấy thuốc có hiện tượng chảy nước, biến màu không dùng được.
- Thuốc đã quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất không được dùng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Nhà sản xuất

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga – Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3724.853

Ngày 09 tháng 12 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Văn Ninh



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Lê Minh Hùng