

Thành phần: (cho 15ml)
Povidon iod.....1,5g
Tá dược.....vừa đủ 15ml

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do Herpes simplex, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gạc lên vết thương sau khi xịt thuốc.

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 15ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DBVN IV

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

BỘ Y TẾ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 15ml

TP PHARM

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 15ml

Thành phần: (cho 15ml)
Povidon iod.....1,5g
Tá dược.....vừa đủ 15ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DBVN IV.

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Lọ 15ml



Thành phần: (cho 30ml)
Povidon iod..... 3g
Tá được..... vừa đủ 30ml

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do *Herpes simplex, zona*, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gạc lên vết thương sau khi xịt thuốc.

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 30ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG - ĐỂ XẢ TÂM TAY TRẺ EM

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 30ml



Thành phần: (cho 30ml)
Povidon iod..... 3g
Tá được..... vừa đủ 30ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Lọ 30ml



TP PHARM

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 30ml



Thành phần: (cho 30ml)
Povidon iod..... 3g
Tá được..... vừa đủ 30ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Lọ 30ml



Thành phần: (cho 60ml)
Povidon iod..... 6g
Tá được..... vừa đủ 60ml

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do *Herpes simplex*, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gạc lên vết thương sau khi xịt thuốc.

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 60ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DBVN IV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XÀ TÂM TAY TRẺ EM

SDK:
Số tờ sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 60ml



Thành phần: (cho 60ml)
Povidon iod..... 6g
Tá được..... vừa đủ 60ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XÀ TÂM TAY TRẺ EM

TP PHARM

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 60ml

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

GMP - WHO

Lọ 60ml

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DBVN IV.

SDK:
Số tờ sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT





Thành phần: (cho 90ml)
Povidon iod..... 9g
Tá dược..... vừa đủ 90ml

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật. Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do Herpes simplex, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gạc lên vết thương sau khi xịt thuốc.

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 90ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DGVN IV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 90ml



TP PHARM

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 90ml

Thành phần: (cho 90ml)
Povidon iod..... 9g
Tá dược..... vừa đủ 90ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật. Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP - WHO

Lọ 90ml

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DGVN IV

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Povidon iod 10% Spray





Thành phần: (cho 125ml)
Povidon iod..... 12,5g
Tá dược..... vừa đủ 125ml

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do *Herpes simplex*, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gạc lên vết thương sau khi xịt thuốc.

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật. Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 125ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 125ml



Thành phần: (cho 125ml)
Povidon iod..... 12,5g
Tá dược..... vừa đủ 125ml

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV.

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật. Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Lọ 125ml



TP PHARM

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 125ml



Thành phần: (cho 200ml)
Povidon iod.....20g
Tà được.....vừa đủ 200ml

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do Herpes simplex, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gác lên vết thương sau khi xịt thuốc.

GMP - WHO
Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 200ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

GMP - WHO
Dung dịch dùng ngoài

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 200ml

Thành phần: (cho 200ml)
Povidon iod.....20g
Tà được.....vừa đủ 200ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP - WHO
Lọ 200ml

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV.

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

TP PHARM

Povidon iod 10% Spray

Hộp 1 lọ x 200ml



Thành phần: (cho 250ml)
Povidon iod.....25g
Tá được.....vừa đủ 250ml

Chỉ định:
Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:
Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do Herpes simplex, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gác lên vết thương sau khi xịt thuốc.

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 250ml

Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XÀ TÀM TAY TRẺ EM

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát
Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 33545949

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 250ml

Thành phần: (cho 250ml)
Povidon iod.....25g
Tá được.....vừa đủ 250ml

Chỉ định: Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.
Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XÀ TÀM TAY TRẺ EM

GMP - WHO

Dung dịch dùng ngoài

**Povidon iod 10%
Spray**

Lọ 250ml

Cách dùng & liều dùng - Chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: DVVN IV.

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

TP PHARM

**Povidon iod 10%
Spray**

Hộp 1 lọ x 250ml



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc dùng ngoài

TP POVIDON IOD 10% SPRAY

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phần: (cho 15ml)

Thành phần hoạt chất: Povidon iod.....

Thành phần tá dược (glycerin, dinatri hydrophosphat dodecahydrat, acid citric khan, nước tinh khiết).....
đủ 15ml

Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài. Mô tả sản phẩm: Chế phẩm là chất lỏng màu nâu thẫm.

Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong lọ nhựa dung tích 15ml, 30ml, 60ml, 90ml, 125ml, 200ml, 250ml. Mỗi lọ được đóng trong 1 hộp giấy có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Chỉ định:

Sát khuẩn và phòng nhiễm khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật.

Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

Cách dùng & liều dùng:

Xịt thuốc lên vùng da để khử khuẩn hoặc xịt vào vùng bị tổn thương (do *Herpes simplex*, zona, vết thương) để tránh nhiễm khuẩn. Ngày xịt 2-3 lần, nếu cần có thể phủ gạc lên vết thương sau khi xịt thuốc.

Chống chỉ định:

- Không dùng thuốc cho người có tiền sử quá mẫn với iod.
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ đẻ thiếu tháng, trẻ sơ sinh, trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 1,5kg (vì có thể gây nhược giáp).
- Không dùng thuốc thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt là bướu giáp nhân colloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không dùng thuốc trong trường hợp thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não, khoang bị tổn thương nặng.

Thận trọng: Cần thận trọng khi dùng thuốc thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, người bệnh đang điều trị bằng lithi.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Tránh dùng thường xuyên cho các đối tượng này, vì iod qua được hàng rào nhau thai và bài tiết qua sữa. Mặc dù chưa có bằng chứng về nguy hại, nhưng vẫn nên thận trọng và cân nhắc giữa lợi ích điều trị và tác dụng có thể gây ra do hấp thu iod đối với sự phát triển và chức năng của tuyến giáp thai nhi.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Cần thận trọng ở những người điều trị kéo dài, có thể gây triệu chứng thần kinh (co giật, cơn động kinh).

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein. Xà phòng không làm mất tác dụng.
- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da.
- Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao, và các thuốc sát khuẩn khác.
- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp.

Tác dụng không mong muốn:

Thuốc có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc dù thuốc ít kích ứng hơn iod tự do. Dùng với vết thương rộng và vết bỏng nặng, có thể gây phản ứng toàn thân.

- Thường gặp, ADR > 1/100

Iod được hấp thu mạnh ở vết thương rộng và bỏng nặng có thể gây nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương chức năng thận.

Đối với tuyến giáp: Có thể gây giảm năng giáp và nếu có giảm năng giáp tiềm tàng, có thể gây cơn nhiễm độc giáp.

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính (ở những người bệnh bị bông nặng).

Thần kinh: Co giật (ở những người bệnh điều trị kéo dài).

- Ít gặp, $1/1000 < ADR < 1/100$

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính (trường hợp bị bông nặng).

Thần kinh: Con động kinh (nếu điều trị bằng Povidon iod kéo dài).

Dị ứng, như viêm da do iod, đốm xuất huyết, viêm tuyến nước bọt, nhưng với tỷ lệ rất thấp.

Đã thấy iod trong nước ối của người mẹ dùng povidon iod gây suy giáp và bướu giáp bẩm sinh do thuốc ở trẻ sơ sinh, mặc dù người mẹ dùng lượng thấp iod làm thuốc sát khuẩn. Tuy nhiên, Povidon iod cũng có thể gây cường giáp.

Quá liều và cách xử trí:

- Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Dùng chế phẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bông sẽ gây tác dụng không mong muốn như vị kim loại, tăng tiết nước bọt; đau rát họng và miệng, mắt bị kích ứng, sưng, đau dạ dày, ỉa chảy, khó thở do phù phổi. Có thể bị nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương thận.
- Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.
- Trong trường hợp uống nhầm một lượng lớn povidon iod, phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

Các đặc tính dược lực học, dược động học:

Mã ATC: D08A G02.

Nhóm dược lý: Thuốc sát khuẩn.

Dược lực học: Povidon iod là thuốc sát khuẩn có phổ kháng khuẩn rộng. Povidon iod (PVP - I) là phức hợp của iod với polyvinylpyrrolidon (povidon), chứa 9 đến 12 % iod, dễ tan trong nước và trong cồn; dung dịch chứa 0,85 - 1,2 % iod có pH 3,0 - 5,5. Povidon được dùng làm chất mang iod. Dung dịch povidon iod giải phóng iod dần dần, do đó kéo dài tác dụng sát khuẩn, diệt khuẩn, nấm, virus, động vật đơn bào, kén và bào tử. Vì vậy tác dụng của thuốc kém hơn các chế phẩm chứa iod tự do, nhưng ít độc hơn, vì lượng iod tự do thấp hơn, dưới 14 phần triệu trong dung dịch 10%.

Dược động học: Iod thẩm được qua da và thải qua nước tiểu. Hấp thu toàn thân phụ thuộc vào vùng và tình trạng sử dụng thuốc (diện rộng, da, niêm mạc, vết thương, các khoang trong cơ thể). Khi dùng làm dung dịch rửa các khoang trong cơ thể, toàn bộ phức hợp cao phân tử povidon - iod cũng có thể được cơ thể hấp thu. Phức hợp này không chuyển hóa hoặc đào thải qua thận. Thuốc được hệ liên võng nội mô lọc giữ.

Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 2 tháng kể từ ngày mở nắp.


Tiêu chuẩn chất lượng: ĐVN IV.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 33545949



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh