

# TIGER BALM PLASTER-RD

虎標鎮痛藥布-RD



**XEM BÊN TRONG**  
Tấm lót dính  
giúp tăng thêm độ dính

## Tờ hướng dẫn sử dụng

## NÓNG

### THÀNH PHẦN

Tên hoạt chất	Hàm lượng (%KL/KL)
Camphor (Camphora)	1,0%
Tinh dầu Bạc hà (Oleum menthae)	0,6%
Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti)	0,5%
Menthol (Mentholum)	0,3%
Dịch chiết ớt (Capsicum extractum)	0,2%

### Tá dược

Dung dịch Sorbitol 70%, Jurymer AC-10H, Jurymer SH 8, Glycerin đậm đặc, Kaolin nặng, Propylene Glycol, Natri CMC 2200, Natri CMC 1380, Natri Polyacrylate, Polysorbate 80, Hidrotalcite tổng hợp, Nhôm Dihydroxyaluminum Aminoacetate, Nước tinh khiết.

### QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

Túi gồm 3 miếng dán 10 cm x 14 cm.

### DẠNG BÀO CHẾ:

Cao dán.

### CHỈ ĐỊNH:

Giảm các triệu chứng mỏi cơ, đau và nhức cơ, cứng cổ và vai, vết đụng đập, bong gân và đau lưng.

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Làm sạch và khô vùng dán thuốc. Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ và dán miếng cao dán lên vùng bị đau từ một đến hai lần mỗi ngày. Không dán miếng cao dán 1 tiếng trước hoặc sau khi tắm.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân có tiền sử hoặc có nguy cơ bị sung huyết da hoặc kích ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

### THẬN TRỌNG

**THUỐC SỬ DỤNG NGOÀI DA.** Không dán vào vết thương hở, tránh các vùng gần mắt và niêm mạc. Phụ nữ có thai

và đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi và những người có phản ứng dị ứng với với thuốc hoặc mỹ phẩm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Ngưng dùng nếu có kích ứng da xảy ra. Để xa tầm tay trẻ em.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Liên hệ với bác sĩ để biết thêm thông tin.**

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có tương tác nào với thuốc được biết.

### PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai và đang cho con bú cần tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng.

### TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gây kích ứng da ở người da nhạy cảm, phản ứng quá mẫn, viêm da tiếp xúc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Chưa có dữ liệu.

### TƯƠNG Kỵ

Chưa có ghi nhận.

### HẠN DÙNG

3 năm kể từ ngày sản xuất.


### BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô, mát.

Nhiệt độ không quá 30°C.


Giữ miếng cao dán chưa dùng trong bao bì gốc. Không để miếng cao dán chưa dùng ngoài không khí trong thời gian quá lâu.

### Hướng dẫn sử dụng




1

Gỡ bỏ phần giữa tấm lót dính. Không gỡ các dải bên lề.



2

Đặt miếng cao dán vào giữa tấm lót, với lớp màng nhựa hướng đối diện mặt. Gỡ bỏ các dải bên lề.



3

Gỡ bỏ lớp màng nhựa và dán lên vùng bị đau.

