

# VG-5

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em

**TÊN THUỐC:** Viên nén bao phim VG-5

**THÀNH PHẦN:** Cho 1 viên nén bao phim

*Thành phần hoạt chất*

Cao khô điệp hạ châu đắng.....100 mg

Tương ứng với 500 mg điệp hạ châu đắng (*Herba Phyllanthi amari*)

Cao khô nhân trần.....130 mg

Tương ứng với 1820 mg nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*)

Cao khô cỏ nhọ nổi .....50 mg

Tương ứng với 350 mg cỏ nhọ nổi (*Herba Ecliptae*)

Cao khô râu bắp.....50 mg

Tương ứng với 850 mg râu bắp (*Styli et Stigmata Maydis*)

*Thành phần tá dược*

Lactose monohydrat, Eragel, tinh bột mì, povidon K30, microcrystalline cellulose 102, sodium starch glycolat, talc, magnesi stearat, Aerosil, HPMC 606, HPMC 615, maltodextrin, titan dioxyd, PEG 400, màu brown.

## **DẠNG BẢO CHẾ**

Viên nén bao phim màu nâu, mặt viên nhẵn bóng, mùi thơm dược liệu, cạnh và thành viên lành lặn.

## **CHỈ ĐỊNH**

- Hạ men gan, tăng cường chức năng gan, bổ gan.
- Hỗ trợ điều trị viêm gan cấp và mạn tính, đặc biệt là viêm gan siêu vi B.

## **LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG**

- Người lớn: Mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần.

- Trẻ em: Dùng 1/2 liều người lớn.

Uống thuốc trước bữa ăn 30 phút.

## **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

## **CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG THUỐC**

Thuốc có chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu glucose - galactose không nên dùng thuốc này.

Thuốc có chứa màu brown, có thể gây phản ứng dị ứng.

**SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Sử dụng được ở người đang lái xe hay vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC**

Chưa có tương tác thuốc nào được ghi nhận.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC**

Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

**Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Trường hợp quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.

**DƯỢC LỰC HỌC**

- Ức chế virus viêm gan B, làm giảm HbsAg, HbeAg huyết thanh trong viêm gan.
- Bảo vệ và phục hồi chức năng gan, tăng khả năng thải độc của gan, hạ men gan.
- Chống viêm, tăng tiết mật, lợi tiểu.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC**

Chưa có thông tin.

**DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC**

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng thuốc.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. *Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.*

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI**

Hộp 1 lọ 40 viên, hộp 1 lọ 60 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 4 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, lọ 1000 viên (chỉ dùng cho xuất khẩu), có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:** TCCS.

**Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 05/04/2019**

Cơ sở sản xuất

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3760130 Fax: 0236.3760127 Tư vấn: 0236.3760131

Email: info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc