


Viên nang cứng

Vin-Hepa 500

L-Ornithine-L-Aspartate 500mg



Box 1 blister x 10 hard capsules

500mg

SDK: VD-17046-12

Sử dụng rộng rãi trong các trường hợp :

- **Bệnh lý về gan :** viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan virus, tổn thương nhu mô gan, gan nhiễm mỡ...
- Dùng để bảo vệ và giải độc tế bào gan.
- Các trường hợp phải dùng thuốc liều cao, kéo dài.
- Tổn thương gan do rượu hoặc hóa chất.
- Dị ứng, ăn không ngon.

Vin-Hepa 500

L-Ornithine-L-Aspartate 500mg

VIÊM GAN, XƠ GAN

- **Thành phần:**
Mỗi viên nang cứng Vin-Hepa 500 chứa:
Được chất L-ornithin L-aspartat 500mg
Tá dược: Tinh bột sắn, Glycerol, Talc, Magnesiesterat vừa đủ... 1 viên.
- **Dạng bào chế và quy cách đóng gói:**
Viên nang cứng.
Hộp 6 vỉ x 10 viên.
- **Được lực học:**
- L-ornithin tham gia vào chu trình Urê, kích thích sự tạo thành acid uric ở gan, qua đó gián tiếp làm giảm nồng độ NH₃.
- L-aspartat kích thích sự tạo thành L-ketoglutarat và glutamat nhằm giảm nồng độ amoniac ở não.
- L-aspartat kích thích sự tạo thành ATP liên quan đến chu trình T.C.A, kích thích sự chuyển hóa năng lượng giữa chất gian bào của ty thể với bào tương, qua đó cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp Urê và kích thích cho các chức năng gan khác, đặc biệt là chức năng chuyển hóa mỡ và tái tạo nhu mô gan.
- Sự phối hợp L-aspartat và L-ornithin có tác dụng tương hỗ trong làm giảm nồng độ NH₃.
- **Chỉ định:**
Sử dụng rộng rãi trong các trường hợp:
Bệnh lý về gan: viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan virus, tổn thương nhu mô gan, gan nhiễm mỡ.
Dùng để bảo vệ và giải độc tế bào gan.
Các trường hợp phải dùng thuốc liều cao, kéo dài.
Tổn thương gan do rượu hoặc hóa chất.
Dị ứng, ăn không ngon.
- **Chống chỉ định:**
- Quá mẫn các thành phần khác của thuốc.
- Suy thận nặng.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH PHÚC
Số 777 Đường Mỹ Linh, P. Khai Quang,
Tp. Vinh Yên, T. Vinh Phúc

- **Liều dùng và cách dùng:**
- Người lớn: Uống 1 - 2 viên/lần, 3 lần trong ngày.
- Trẻ em trên 6 tuổi: 1 viên/lần, 2 - 3 lần trong ngày.
Liều có thể được điều chỉnh theo độ tuổi bệnh nhân và triệu chứng bệnh.
- **Thận trọng:**
Khi dùng thuốc liều cao phải theo dõi nồng độ Urê huyết và Urê niệu.
Thận trọng với phụ nữ có thai và cho con bú.
- **Phụ nữ có thai và cho con bú:**
Chưa có các nghiên cứu về độ an toàn khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
Chỉ sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.
- **Vận hành máy móc, lái xe:**
Thuốc không tác động đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
- **Tác dụng không mong muốn:**
Hiếm gặp: Trên tiêu hóa: buồn nôn, nôn.
Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- **Hạn dùng:** 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Thầy thuốc.