




209/D143

MẪU NHÃN HỘP THUỐC VIÊN NÉN VITAMIN B1 50 mg



Traphaco

Hồ sơ đăng ký lại Viên nén Vitamin B₁ 50 mg



Toa hướng dẫn sử dụng

Vitamin B₁ 50 mg

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Vitamin B₁ (Thiamin nitrat).....50mg

Tá dược (Tinh bột, Lactose, Talc, Magnesi stearat).....vừa đủ

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG:

Trong cơ thể, Vitamin B₁ chuyển thành dạng có hoạt tính là Coenzym thiamin pyrophosphat. Coenzym này tham gia vào chuyển hóa hydratcarbon bằng cách khử carboxyl các Acid a-ceto (như Pyruvic, a- cetoglutaric) hoặc bằng cách tận dụng Pentose trong chu trình Hexose monophosphat. Do vậy, Vitamin B₁ có vai trò kích thích quá trình đồng hóa thức ăn, kích thích cảm giác thèm ăn.

Thiếu hụt Vitamin B₁ sẽ gây ra bệnh tê phù (Beriberi). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện trên hệ thần kinh như viêm dây thần kinh ngoại biên, rối loạn cảm giác các chi (có thể tăng hoặc mất cảm giác). Trương lực cơ giảm dần và có thể gây ra chứng bại chi hoặc liệt một chi nào đó. Thiếu hụt trầm trọng gây rối loạn nhân cách, trầm cảm, trí nhớ kém. Biểu hiện của thiếu hụt Vitamin B₁ trên tim mạch bao gồm khó thở khi gắng sức, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh và các rối loạn khác trên tim.

Thiếu hụt Vitamin B₁ có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân:

- Tuy có sẵn trong thực phẩm nhưng do kém bền với nhiệt độ và ánh sáng nên quá trình bảo quản, chế biến thực phẩm sẽ làm giảm nhanh hàm lượng Vitamin này.
- Do nhu cầu tăng nhưng cung cấp không đủ: tuổi dậy thì, có thai, cho con bú, ốm nặng, nghiện rượu, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.
- Do giảm hấp thu: ỉa chảy kéo dài, người cao tuổi.
- Do mất nhiều Vitamin này khi thẩm phân phúc mạc, thẩm phân thận nhân tạo.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hấp thu ở ruột non qua vận chuyển tích cực; với liều cao thì cũng có thể khuếch tán thụ động. Phân bố nhiều nhất ở gan, não, thận, tim. Khi các mô đã bão hòa thì Vitamin B₁ sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng Thiamin không chuyển hóa, hoặc dạng Pyrimidin.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và chữa các bệnh tê phù, viêm đa dây thần kinh, đau dây thần kinh, chứng liệt ngoại vi, nhiễm độc thần kinh do nghiện rượu, mệt mỏi kém ăn.

LIỀU DÙNG: Uống 1 viên/lần, 1 - 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ do thuốc gây nên.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Traphaco

Hồ sơ đăng ký lại Viên nén Vitamin B₁ 50 mg



BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh