



Voltex (Kem xoa giảm đau)

Thành phần

Mỗi tuýp 25 g chứa:

Methyl Salicylat	2,55 g
Menthol	1,36 g
Eugenol	0,34 g

Tá dược: Atlas G 1726 (PEG-20 Sorbitan Sáp ong), glyceryl monostearat, natri lauryl sulfat, carbomer 934, natri hydroxid, nước tinh khiết.

Dạng bào chế

Kem

Chỉ định

Làm giảm đau cơ, đau do bệnh thấp khớp, bong gân.

Liều lượng và cách dùng

Bôi 3-4 lần mỗi ngày vào các vùng bệnh và xoa nhẹ nhàng.

Đường dùng: Dùng tại chỗ

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Không dùng trên vùng da bị nhiễm trùng hoặc bị tổn thương.

Thận trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc chỉ dùng ngoài.

Chỉ bôi thuốc vào vùng da lành, không được bôi vào các vết thương ở da hoặc các vết thương hở. Không để thuốc tiếp xúc với mắt hoặc niêm mạc.

Không được dùng đường uống!

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Nói chung thuốc được xem là an toàn. Nên dùng thuốc theo hướng dẫn.

Tác động khi lái xe và sử dụng máy móc

Không thấy có tác động.

Tương tác thuốc

Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

Phản ứng phụ

Voltex thường được dung nạp tốt. Có thể gặp ngứa, đỏ hoặc nổi ban da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều

Không có nguy cơ về quá liều. Trong trường hợp vô ý uống nhầm, làm trống dạ dày bằng cách hút dịch và rửa dạ dày. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ thêm.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không quá 30°C.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

Quy cách đóng gói

Hộp carton chứa 1 tuýp nhôm 25 g.

Nhà sản xuất

The United Drug (1996) Co., Ltd.

208 Romkiao Road, Minburi,

Bangkok 10510, Thailand

Tel: (662) 543-8210-2

Fax: (662) 543-8213