



Viên nén nhai Hemifere. Hộp 1 vỉ x 10 viên nén nhai. Mỗi viên nén nhai chứa: Sắt nguyên tố (dưới dạng phèn bột sắt (III) Hydroxide Polymaltose Complex) 350mg; Acid Folic 100mcg. SĐK: XXX-XXXX-XX. Chiết, cách định, chưng chi định, thận trọng, tác dụng phụ: xin đọc trong tờ hướng dẫn và dùng Sđk là SX, NSX, HD: xem "Batch No.", "Mfg. date", "Exp. date" trên bao bì. Bảo quản ở dưới 30°C tránh ánh nắng. Dùng cho trẻ em. Dùng khi cần thiết. Sản xuất bởi: The Schazzoo Pharmaceutical I Laboratories (Pvt.) Limited, Kallawala, 20 Km Lahore-Jamian Road, Pakistan. Nhập khẩu:

Các thông tin khác để nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng kín theo.

Manufactured by:
The Schazzoo (Pvt) Limited,
Laboratories
Kallawala, 20 Km Lahore-Jamian Road, Pakistan.
www.schazzoo-pvt.com

COMPOSITION:
Each chewable tablet contains:
Elemental Iron (as Iron (III) Hydroxide
Polymaltose Complex) 350 mg
Folic acid 100 mcg

For the treatment of
Iron deficiency anemia

Hemifere

Elemental Iron (as Iron (III) Hydroxide
Polymaltose Complex & Folic Acid)

1x10 Chewable Tablets

DOSAGE:
Indication, contraindication and administration:
See package before use, carefully read the
accompanying instruction before use.

DIRECTIONS:
Store below 30°C protect from light.
Keep all medicines out of the reach of children.

Batch No.:
Mfg. Date:
Exp. Date:
Mfg. Lic. No.: 00019
Reg. No. in Pakistan: 037510
Reg. No. in Vietnam: XX-XXXX-XX

Hemifere

Elemental Iron (as Iron (III) Hydroxide
Polymaltose Complex & Folic Acid)



Hemifere

mua

Viên nén nhai Hemifere. Hộp 3 vi x 10 viên nén nhai. Mỗi viên nén nhai chứa: Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp sắt (III) Hydroxid Polymaltose) 100mg, Acid Folic 350mcg. SĐK: XX-XXXX-XX. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Số lô SX, NSX, HD: xem "Batch No.", "Mfg. date", "Exp. date" trên bao bì. Bảo quản ở dưới 30°C tránh ánh sáng. Đè xa tầm tay trẻ em. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản xuất bởi: The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Limited, Kalawala, 20 Km Lahore-Jaranwala Road, Pakistan. Nhà nhập khẩu: Các thông tin khác đề nghị xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Size:
Width 133 mm
Height 58 mm
Breadth 20 mm

CARD GRAMMAGE:
300 gm Bleech board
with blind emboss.
with Hi-gloss varnish

COLOUR KEY:
4 color job

【例題】

July

• 250 mm •



Space Distribution

$$55\text{mm} \times 4\text{mm} = 220\text{mm}$$

$$6\text{mm} \times 5\text{mm} = 30\text{mm}$$

Total: 250mm

HEMIFERE

(Viên nén nhai chứa sắt và acid folic)

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén nhai có chứa:

Hoạt chất: pherc hợp sắt III hydroxide polymaltose tương đương với sắt nguyên tố 100mg, acid folic 350mcg.

Tá dược: Bột sorbitol, aspartame, kollidon CL-M, avicel pH 102, bột hương vị sô cô la, magnesium stearate.

NLH

CHỈ ĐỊNH

- Phòng và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt và acid folic
- Điều trị tình trạng thiếu sắt và acid folic ở phụ nữ có thai, cho con bú khi thức ăn không cung cấp đủ.
- Cơ thể kém hấp thu sắt: Cắt đoạn dạ dày, viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm ruột mãn tính
- Chứng xanh lướt ở thiếu nữ và phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Nhai nát viên thuốc trước khi chiêu với một cốc nước.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

Bổ sung chế độ ăn: 1 viên/ ngày. Đợt điều trị khoảng 8- 12 tuần.

Điều trị: 1 viên/lần x 3 lần/ngày

Phụ nữ khi biết có thai uống 1 viên /ngày, đều đặn suốt thời gian mang thai cho đến một tháng sau đẻ. Phụ nữ từ 15 - 30 tuổi (không có thai) uống mỗi tuần một viên.

Trẻ em dưới 12 tuổi: dạng viên nén nhai không phù hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Nên dùng dạng si rô hoặc thuốc nhỏ giọt

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Bệnh gan nhiễm sắt
- Thiếu máu tan máu
- Bệnh đa hồng cầu.
- Trẻ em dưới 12 tuổi

NHỮNG LUU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC

Không sử dụng sắt để điều trị thiếu máu tan huyết trừ trường hợp cũng bị tình trạng thiếu sắt. Không nên dùng thuốc cho những bệnh nhân thường xuyên được truyền máu, vì trong hemoglobin của hồng cầu được truyền có một lượng sắt đáng kể.

Acid folic nên được dùng thận trọng cho những bệnh nhân bị thiếu máu chưa được chẩn đoán vì có thể làm che lấp triệu chứng thiếu máu ác tính đưa đến tiến triển những biến chứng thần kinh.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Thuốc làm giảm hấp thu cycilin (Tetracyclin, Docycyclin,...). Các thuốc kháng acid làm giảm hấp thu sắt. Không nên uống nước trà khi dùng thuốc

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thuốc được khuyên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Có thể có rối loạn tiêu hoá nhẹ. Phân có màu đen là tình trạng bình thường khi sử dụng thuốc này.

Ghi chú: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Thành phần sắt trong viên nén nhai Hemifere ở dạng phức hợp sắt III polymaltose là cấu trúc đại phân tử của nhiều nhân sắt III hydroxyd và phân tử dextrin thuỷ phân (polymaltose), có khả năng kiểm soát tốt sự hấp thu qua màng tế bào, sử dụng an toàn, tránh được nguy cơ quá liều so với sản phẩm có chứa sắt vô cơ.

Chưa có ghi nhận về độc tính của acid folic khi dùng quá liều, vì acid folic tan trong nước nên nếu uống dư thừa sẽ được cơ thể loại ra theo nước tiểu.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Nhà sản xuất

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ THỜI HẠN GHI TRÊN NHÃN



BẢO QUẢN

Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

GIỮ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

TRÌNH BÀY

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén nhai

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén nhai

NHÀ SẢN XUẤT

The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Limited
Kalalwala, 20Km Lahore-Jaranwala Road, Pakistan

