



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### HEPAQUEEN PLUS

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Để xa tầm tay của trẻ em*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc*

**Dạng bào chế:** Viên nang mềm

**Thành phần:** Cho 1 viên:

Cao khô *Carduus marianus* ..... 250,0 mg  
(tương đương Silymarin 140,0 mg)

- **Tá dược:** Lecithin, sáp ong trắng, dầu cọ, dầu đậu nành, aerosil, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol, ethyl vanillin, methyl paraben, propyl paraben, butylated hydroxytoluen, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, allura red AC, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

**Tác dụng**

- Cao khô *Carduus marianus* (Milk thistle) có thành phần hoạt chất chính Silymarin là một hỗn hợp các flavonolignan gồm silybin, isosilybin, silychristin và silydianin, trong đó silybin có tác dụng sinh học mạnh nhất.  
- Silymarin giúp bảo vệ tế bào gan do có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự peroxide hóa lipid và tăng cường giải độc gan. Silymarin còn có tác dụng chống viêm, tăng tổng hợp protein của tế bào gan do đó kích thích sự phục hồi và tái tạo các tế bào gan.

**Chi định**

- Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.  
- Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, bia, người bị ngộ độc thực phẩm hoặc hóa chất, người đang sử dụng các thuốc có hại tới gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiêu đường...)  
- Các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa...

**Liều lượng và cách dùng**

- Người lớn: Uống 1 viên/lần x 2 – 3 lần/ngày

**Chống chỉ định**

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc  
- Tắc mật hoàn toàn, suy tế bào gan nặng  
- Trẻ em dưới 18 tuổi  
- Phụ nữ mang thai và cho con bú

**Thận trọng**

- Không dùng quá liều chỉ định.

**Tác dụng không mong muốn**

- Với liều thông thường rất hiếm gặp tác dụng không mong muốn  
- Khi dùng cao *Carduus marianus* ở liều cao (>1500 mg/ngày) có thể gây tác dụng nhuận tràng, dị ứng nhẹ

*Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gấp phải trong khi sử dụng thuốc*

*Thời kì có thai và đang cho con bú*

- Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng cao *Carduus marianus* cho phụ nữ có thai và cho con bú. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng

**Người lái xe và vận hành máy móc:** Được dùng.

**Tương tác thuốc:** Chưa có thông tin

**Quá liều và xử trí**

- Cho đến nay chưa rõ các dấu hiệu quá liều hoặc ngộ độc. Các tác dụng phụ có thể tăng lên. Nếu cần, đến gặp bác sĩ để có biện pháp điều trị triệu chứng

**Qui cách đóng gói**

- Hộp 12, 20 viên x 5 viên; hộp 6 viên x 10 viên. Vì PVC/nhôm

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**Nhà sản xuất:** Công ty CP Dược TW

MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Sản xuất tại: Nhà máy Dược phẩm số 2, Trung Hậu –  
Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội

**Nhà phân phối:** Công ty CP Wallgreen Pharmacies

Địa chỉ: Số 9/195 Đại Cân – Ba Đình – Hà Nội

*.....*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Hà Xuân Sơn



TUẤN LÂM  
P.T TRƯỞNG PHÒNG  
Nguyễn Ngọc Ánh