



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM HEXIEYE

Giới thiệu:

Viêm giác mạc do amip *Acanthamoeba*, vi khuẩn, nấm xảy ra khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào giác mạc mắt, dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn hoặc mù lòa.

Hexieye được sử dụng để hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm giác mạc, ngay cả amip *Acanthamoeba*, những vi khuẩn, nấm đã không đáp ứng với các phác đồ điều trị kháng sinh thông thường. Hexieye sử dụng hệ tá dược nhũ tương Nano technology, làm tăng sinh khả dụng của Clorhexidin hơn dạng dung dịch do tăng bám dính, kéo dài thời gian lưu tại đích tác dụng. Ngoài ra, chất nhũ hoá còn giúp Clorhexidin khuếch tán vào màng nước mắt dễ dàng và tăng thấm qua giác mạc, do đó tác dụng diệt khuẩn được cải thiện hơn so với dạng dung dịch. Nano nhũ tương Hexieye diệt khuẩn mạnh, không gây xót, rát, thân thiện với người dùng.

Thành phần:

Clorhexidin gluconat, vitamin E, acid acetic, glycerin, dầu khoáng, tyloxapol, poloxamer 188, nước.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 ống 5 mL; 10 mL;

Hộp 20 ống 0,5 mL; 1 mL

Công dụng:

Sử dụng trong viêm giác mạc do amip *Acanthamoeba*, vi khuẩn, nấm

Sử dụng trong dự phòng nhiễm khuẩn mắt trước phẫu thuật

Không sử dụng:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, đặc biệt ở những người có tiền sử phản ứng dị ứng liên quan đến Clorhexidin gluconat

Hướng dẫn sử dụng:

- Đối với viêm giác mạc: 2-3 ngày đầu tiên nhỏ 1 giọt liên tục mỗi giờ, 5 ngày tiếp theo nhỏ cách 1 giờ vào buổi sáng. Tùy theo đáp ứng điều trị, sau tuần đầu có thể giảm liều 4 lần/ngày

- Đối với dự phòng nhiễm khuẩn mắt trước phẫu thuật sử dụng 30 mL cho mỗi lần sử dụng.

Thận trọng:

Nếu xảy ra hiện tượng đau, ngứa rát khi nhỏ lâu hơn 30 phút, cần liên hệ với bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 15 ngày kể từ ngày mở nắp

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội