

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC**Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng****Để Xa Tầm Tay Trẻ Em****Nếu Cần Thêm Thông Tin Xin Hỏi Ý Kiến Bác Sĩ****THÀNH PHẦN:** Mỗi viên bao phim chứa:

- Thành phần hoạt chất:

Cao khô hỗn hợp dược liệu	190 mg
(Tương ứng với: Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	760 mg
Đào nhân (<i>Semen Pruni</i>)	70 mg
Hồng hoa (<i>Flos Carthami tinctorii</i>)	70 mg
Địa long (<i>Pheretima</i>)	160 mg
Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>)	80 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	60 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	140 mg
Xích thược (<i>Radix Paeoniae</i>)	140 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	140 mg

- Thành phần tá dược: Lactose, bột talc, magnesi stearat, ethanol 96%, DST, pharmacoat 606, màu Ponceau 4R, màu Brown HT vừa đủ 1 viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.**MÔ TẢ DẠNG BÀO CHẾ:** Viên bao phim hình bầu dục, màu nâu đỏ, bên trong là nhân có màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị nhạt.**TÁC DỤNG:** Bổ khí, hoạt huyết, khử ứ, khai thông kinh lạc, cải thiện huyết áp, cải thiện tuần hoàn, ngăn ngừa tai biến mạch máu não.**CHỈ ĐỊNH:** Dùng trị các chứng đau thắt ngực, hồi hộp, mệt do thiếu máu cơ tim, khó thở khi gắng sức, chứng tê mỏi chân tay. Cải thiện thể lực cho người sau tai biến mạch máu não.**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:** Người lớn: Uống mỗi lần 2 – 3 viên, ngày 2 lần. Uống với nước ấm, sau các bữa ăn. Dùng liên tục khi nào hết các triệu chứng trên thì ngưng. Thuốc không độc nên có thể dùng lâu dài.**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Phụ nữ có thai hoặc cho con bú, phụ nữ bị rong kinh và các trường hợp chấn thương gây chảy máu kín hoặc hở.**THẬN TRỌNG:** Thận trọng sử dụng thuốc khi cao huyết áp, rối loạn nhịp tim.**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ THUỐC:****Tương tác thuốc:** Khi dùng thuốc này nên tránh ớt, đồ cay nóng.**Tương kỵ thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.**QUÁ LIỀU:**

- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Nóng nực, căng thẳng.

- Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo thì giảm liều hoặc ngưng dùng và uống thêm thuốc mát: đại bổ âm, dùng thêm 2 viên Lục Vị Nang Vạn Xuân, ngày 3 lần.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 40 viên bao phim, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.**TIÊU CHUẨN:** TCCS