

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO

2. Các câu khuyến cáo:

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thuốc bán theo đơn

3. Mô tả sản phẩm:

- Viên nén bao đường hình tròn màu đen, nhãn bóng, cạnh và thành viên láng mịn. Nhấn bên trong màu nâu đen, đồng nhất, có mùi thơm dược liệu.
- Hộp 1 vỉ x 20 viên nén bao đường ; hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

4. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Mỗi viên nén bao đường chứa

Cao rễ rễ đinh lăng (<i>Extractum Radix Polysciacis spissum</i>)	150,0 mg
<i>(Tương ứng với 1500 mg rễ đinh lăng)</i>	
Cao khô lá bạch quả (<i>Extractum Foli Ginkgo siccus</i>)	20,0 mg
<i>(Hàm lượng Flavonoid toàn phần ≥ 24%)</i>	
<i>Tá dược:</i> Talc, canxi cacbonat, PVP K30, nipagin, nipazol, Mg stearat, đường trắng, tinh bột sắn, than hoạt, erythrosine lake, parafin rắn vừa đủ 1 viên.	

5. Tác dụng:

- Hoạt huyết đường não là thuốc bổ thần kinh, được bào chế hoàn toàn từ thảo dược. Thuốc là sự tiếp thu kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh của các nhà khoa học Pháp và Việt Nam.
- Hoạt huyết đường não làm tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não.
- Hoạt huyết đường não cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, làm tăng cung cấp máu cho não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.
- Hoạt huyết đường não có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng Dopamin não, làm giảm các triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson. Ngoài ra còn tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân Parkinson.

6. Chỉ định điều trị

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não với các biểu hiện : đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng, ù tai.
- Giảm chức năng não bộ : giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
- Chứng run giắt của bệnh nhân Parkinson.
- Hỗ trợ điều trị nhũn não.

7. Cách dùng và liều lượng

- Người lớn: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên.
- Trẻ em : Ngày uống 2 - 3 lần , mỗi lần 1 - 2 viên.

8. Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc

9. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai.
- Người đang chảy máu, người bị rối loạn đông máu.
- Nhồi máu não, tim cấp.

10. Tác dụng không mong muốn

- Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu nhưng rất hiếm xảy ra.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Tương tác với những thuốc khác

- Chưa có báo cáo

12. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.

13. Bảo quản thuốc

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30° C, tránh ánh sáng.

14. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

- Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

15. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo

- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

16. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh
 Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá,
 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
 Điện thoại: 024.35596583

17. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Viên hoạt huyết đường não không phải là thuốc hạ huyết áp, do đó không thể thay thế điều trị những bệnh cao huyết áp.

18. Khi nào cần tham vấn bác sỹ

- Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong muốn xin tham vấn ý kiến bác sỹ.