




llh



Viên nang cứng
HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO QN
Thiếu năng tuần hoàn não
Hội chứng tiền đình

Công dụng:

Hoạt huyết đường não QN làm tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như:

Đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, làm tan lủa lượng tuần hoàn não, cung cấp máu cho não, phục hồi các chức năng hoạt động của não bộ, kích thích ăn ngon.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các trường hợp sau:

Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung.

Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện:

Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não

Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Tác dụng phụ: Hiện chưa thấy có tác dụng không mong muốn của thuốc. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nếu gặp hiện tượng bất thường hãy ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Sử dụng khi đang vận hành máy móc tàu xe: Thuốc không gây ảnh hưởng trong khi đang vận hành máy móc tàu xe.


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Địa chỉ: 701 - Lê Thái Tổ - TP. Hà Nội - Quảng Ninh

Điện thoại: 051 3801156 Fax: 051 3801747

E-mail: dvtu@trungtamthuoc.vn

Trụ sở: 141 Nguyễn Huệ - Việt Nam - Hà Nội - Quảng Ninh



Viên nang cứng
HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO QN
Thiếu năng tuần hoàn não
Hội chứng tiền đình

Thành phần:

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Cao đặc rễ đinh lăng.....150mg

Cao khô lá bạch quả.....20mg

Tá dược.....vd.....1 viên

Cách dùng: Người lớn uống 2 - 3 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Trẻ em ≥ 12 tuổi uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Tương tác thuốc: không dùng với thuốc chống đông kinh, chống trầm cảm, thuốc kết tập tiểu cầu. Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng đồng thời với các thuốc có tác dụng chỉ huyết.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi. Người đang có xuất huyết rối loạn đông máu, pha loãng máu cơ tim, não cấp.

Bảo quản: Để nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK: Tiêu chuẩn: T/CVS

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của dược sĩ, bác sĩ.

La SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:




8 936051 890575

Viên nang cứng
HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO QN
Thiếu năng tuần hoàn não
Hội chứng tiền đình



NHÂN TRUNG GIAN



Công dụng:

Hoạt huyết dưỡng não QN làm tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như:

Đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, cung cấp máu cho não, phục hồi các chức năng hoạt động của não bộ, kích thích ăn ngon.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các trường hợp sau:

Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung.

Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện:

Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.

Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Tác dụng phụ: Hiện chưa thấy có tác dụng không mong muốn của thuốc. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nếu gặp hiện tượng bất thường hãy ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Sử dụng khi đang vận hành máy móc tàu xe: Thuốc không gây ảnh hưởng trong khi đang vận hành máy móc tàu xe.


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tổ 14 Thành Trung - TP. Hải Phòng - Quảng Ninh

Điện thoại: 091.360516, Fax: 091.360517

Email: doctruoc@vtsytc.vn

Trụ sở: 10/11A, Khu 19 - Việt Hưng - Hà Nội - Việt Nam



Thành phần:

Hộp 5 vỉ x 10 viên.

Cao đặc rễ đinh lăng.....150mg

Cao khô lá bạch quả.....20mg

Tá dược.....vd.....1 viên

Cách dùng: Người lớn uống 2 - 3 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Trẻ em > 12 tuổi uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Tương tác thuốc: không dùng với thuốc chống đông kinh, chống

trầm cảm, thuốc liệt tập tiểu cầu. Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng

đồng thời với các thuốc có tác dụng chỉ huyết.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Phụ nữ có thai hoặc cho con

bú, trẻ em dưới 12 tuổi. Người đang có xuất huyết rối loạn đông máu, phả nhồi máu cơ tim, não cấp.

Bảo quản: Để nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK:

Tiêu chuẩn: T/CN

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của dược sĩ, bác sĩ.




8 936051 690575

Lô SK:

Ngày SX:

Hạn dùng:

MẪU NHÃN TRÊN VỈ



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:



**VIÊN NANG CỨNG
HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO QN**

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thành phần	Số lượng
Cao khô lá Bạch quả (<i>Ginkgo Leaves Extract</i>)	20,0mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (<i>Polysciacis Extract Extract</i>)	150,0mg (tương ứng 1500mg dược liệu)
Bột talc (<i>Talcum</i>)	110,0mg
Calci carbonat (<i>Calcii carbonas</i>)	110,0mg
Magnesi stearat (<i>Magnesii stearas</i>)	4,5mg
Tinh bột sắn (<i>Amylum manihoti</i>)	Vđ 450,0mg

TỔNG CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

Công dụng:

- Hoạt huyết dưỡng não QN làm tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như: Đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, cung cấp máu cho não, phục hồi các chức năng hoạt động của não bộ, kích thích ăn ngon.

Chỉ định: Phòng và điều trị các trường hợp sau:

- Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung.
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Tác dụng phụ: Hiện chưa thấy có tác dụng không mong muốn của thuốc nhưng trong quá trình sử dụng nếu gặp hiện tượng bất thường hãy ngừng lại và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Sử dụng khi đang vận hành máy móc tàu xe: Thuốc không gây ảnh hưởng trong khi đang vận hành máy móc, tàu xe.

Cách dùng: Người lớn uống 2- 3 viên/ lần x 2- 3 lần/ ngày

Trẻ em ≥ 12 tuổi uống 1 viên/ lần x 2 lần/ ngày.

Tương tác thuốc: Không dùng với thuốc chống động kinh, chống trầm cảm, thuốc kết tập tiểu cầu. Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng đồng thời với các thuốc có tác dụng chỉ huyết.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, Phụ nữ có thai hoặc cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi, Người đang có xuất huyết rối loạn đông máu, pha nhồi máu cơ tim, não cấp.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30⁰c.

Hạn dùng: 24 tháng

SĐK:

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của Dược sĩ, Bác sĩ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

703- Lê Thánh Tông- Tp Hạ Long- Quảng Ninh

ĐT: 033.3620227; fax:033.3823757

Sản xuất tại: Khu 10- Việt Hưng- Hạ Long- Quảng Ninh